

“ bâtiment à cet endroit, aussi longtemps qu'on permettra cet état de choses, il n'y a pas la moindre chance de faire cesser ces maladies terribles. Au contraire, on doit s'attendre à une augmentation continuelle.”

164. L'eau est toujours un important facteur dans le développement de la fièvre typhoïde, et lorsque le moindre soupçon de danger existe, on doit toujours la faire bouillir avant de s'en servir. On dit aussi qu'un demi-grain d'alun dans chaque gallon d'eau la rendra comparativement pure et exempte d'impuretés.

Purification de l'eau.

165. Il y a eu une légère diminution dans le nombre de sourds et muets en 1886 dans le Manitoba, la proportion étant de 1 par chaque 1,357 âmes comparé avec 1,346 en 1881. Il y avait 19 sourds-muets dans les territoires en 1885, soit 1 par chaque 2,545 âmes. Il y avait une augmentation marquée dans le nombre des aliénés, la proportion étant de 1 par chaque 1,308 âmes; en 1881, elle était de 1 par 1,690 âmes. Dans les territoires, le nombre total était de 10, soit 1 par chaque 4,862 personnes. En 1886, la diminution dans le nombre d'aveugles dans le Manitoba a été très-marquée, le nombre étant seulement d'un par 6,790 personnes contre un par 2,127 en 1881. Dans les territoires, la proportion a été très-forte, s'élevant à un par chaque 819 personnes. On présume que cela est causé par la malpropreté et la fumée chez les Sauvages.

Sourds et muets, aliénés et aveugles dans le Manitoba et les trois districts, 1885 et 1886.