

ORDRE DE FATALITÉ.

1887.	1888.
Atrophie et débilité.	Atrophie et débilité.
Diarrhée.	Diarrhée.
Phthisie.	Affections pulmonaires.
Affections pulmonaires.	Phthisie.
Diphthérie.	Affections cerebro-spinales.
Affections cerebro-spinales.	Diphthérie.
Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins.	Maladies de cœur et des vaisseaux sanguins.
Maladies de gorge.	Maladies de gorge.

Décès causés par certaines maladies chez les enfants 131. 69·34 par cent du nombre total de décès étaient causés par l'atrophie, la débilité et la diarrhée, et 74·66 pour cent respectivement étaient des enfants au-dessous d'un an. La proportion des décès des enfants morts par suite de la diarrhée est à peu près la même, puisque sur un total de 1,906 décès causés par cette maladie, 1,816 ou 95·27 par cent étaient des enfants au-dessous de cinq ans, comparée avec 95·07 pour cent en 1878 et 95·77 par cent en 1886.

Décès causés par la diarrhée dans l'Ontario. 132. D'après les relevés de la province d'Ontario, sur 258 décès causés par la diarrhée dans les villes de cette province en 1887, 210 ou 81·40 par cent étaient des enfants âgés de moins de cinq ans. Cette maladie est plus fréquente dans les villes que dans les campagnes et la proportion pour la province entière a été réduite à 74·02 par cent.

Décès causés par les affections pulmonaires. 133. Sans compter la ville de Windsor qui a envoyé des relevés pour la première fois, il y a eu une diminution de 48 dans les décès causés par la phthisie, mais une augmentation de 257 dans ceux causés par les affections pulmonaires, soit une augmentation totale dans les décès causés par les maladies des poumons de toutes sortes de 209, ce qui donne une proportion de 198 par 1,000 décès. Dans la province d'Ontario, la proportion des décès provenant de ces causes était de 197 par 1,000.

Décès causés par la diphthérie. 134. La diphthérie tient le sixième rang sur la liste des maladies les plus fatales, au lieu du cinquième qu'elle tenait en 1887.