

PROPORTION DES DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR
1,000 AMES DANS LES VILLES SUIVANTES, EN 1888.

VILLES.	Par 1,000.	VILLES.	Par 1,000.
Woodstock.....	1.20	Ottawa.....	0.42
Hull.....	1.16	Victoria, C.B.....	0.40
Brantford.....	0.99	Trois-Rivières.....	0.40
Winnipeg.....	0.95	Sorel.....	0.38
St-Hyacinthe.....	0.82	Halifax.....	0.35
Galt.....	0.69	Hamilton.....	0.35
Sherbrooke.....	0.65	Québec.....	0.33
Montréal.....	0.56	Toronto.....	0.30
Belleville.....	0.55	St-Thomas.....	0.29
Charlottetown.....	0.51	St-Jean.....	0.11

Décès causés par la fièvre typhoïde dans Ontario et certains pays-

La proportion des décès causés par la fièvre typhoïde dans les 27 villes qui ont envoyé des relevés était de 0.44 par 1,000 âmes comparée avec 0.55, en 1887.

136. En 1887, la proportion était de 0.54 par 1,000 dans les villes d'Ontario tandis qu'elle était de 2.68 par 1,000 âmes pour la province entière. Ces chiffres comparent favorablement avec ceux de quelques-unes des autres possessions anglaises comme on verra ci-dessous :—

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR 10,000 AMES DANS
LES PAYS SUIVANTS.

1887—Angleterre et pays de Galles.....	1.82
1888—Irlande.....	3.00
1884—Ecosse.....	2.70
1887—Ontario.....	2.68
1886—Victoria.....	5.30
1886—Nouvelle Galles du Sud.....	6.03
1886—Queensland.....	12.27
1886—Australie Sud.....	3.39
1886—Tasmanie.....	3.47
1886—Nouvelle-Zélande.....	2.30

Décès causés par les maladies zymotiques.

137. La proportion des décès causés par les maladies zymotiques, ou spécialement des maladies qui peuvent être prévenues, au nombre total de décès était de 22.00 comparée avec 23.71 par cent en 1887, et la proportion à la population, était de 0.48 par cent ou 4.88 par 1,000 âmes. Le tableau suivant indique comment elles sont réparties dans les villes où les statistiques mortuaires sont recueillies.