

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE DANS LES VILLES  
CI-DESSOUS MENTIONNÉES EN 1887, 1888 ET 1889.

VILLES.	1887.	1888.	1889.	VILLES.	1887.	1888.	1889.
Montréal . . . . .	125	113	87	Peterboro' . . . . .	6	1	1
Toronto . . . . .	71	51	49	Frédericton . . . . .	1	1	1
Québec . . . . .	22	21	40	Saint-Hyacinthe . . . . .	6	6	9
Hamilton . . . . .	19	15	17	Galt . . . . .	5	5	4
Halifax . . . . .	6	14	11	Hull . . . . .	20	14	4
Winnipeg . . . . .	21	21	38	London . . . . .	8	7	4
Ottawa . . . . .	43	17	19	Brantford . . . . .	9	13	12
Saint-Jean, N.-B. . . . .	6	3	11	Victoria, C.-B. . . . .	8	6	6
Kingston . . . . .	1	6	7	Trois-Rivières . . . . .	2	4	4
Saint-Thomas . . . . .	1	3	3	Woodstock . . . . .	8	10	9
Charlottetown . . . . .	4	7	8	Sorel . . . . .	3	3	4
Guelph . . . . .	3	2	2	Windsor . . . . .	1	1	2
Belleville . . . . .	4	6	1	Saint-Jean, Qué. . . . .	1	1	3
Chatham . . . . .	8	2	6				
Sherbrooke . . . . .	6	6	4	Total . . . . .	411	358	361

PROPORTION DES DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR  
1,000 AMES DANS LES VILLES SUIVANTES, EN 1889.

VILLES.	Par 1,000.	VILLES.	Par 1,000.
Winnipeg . . . . .	1.48	Kingston . . . . .	0.38
Saint-Hyacinthe . . . . .	1.12	Trois-Rivières . . . . .	0.38
Woodstock, Ont. . . . .	1.02	Victoria, C.-B. . . . .	0.32
Brantford . . . . .	0.90	Hull . . . . .	0.28
Chatham, Ont. . . . .	0.70	Saint-Thomas . . . . .	0.28
Québec . . . . .	0.60	Toronto . . . . .	0.27
Charlottetown . . . . .	0.58	Halifax . . . . .	0.26
Saint-Jean, Qué. . . . .	0.54	Saint-Jean, N.-B. . . . .	0.25
Sorel . . . . .	0.48	Guelph . . . . .	0.19
Ottawa . . . . .	0.43	Windsor . . . . .	0.19
Sherbrooke . . . . .	0.42	London . . . . .	0.15
Montréal . . . . .	0.41	Frédericton . . . . .	0.13
Hamilton . . . . .	0.38	Belleville . . . . .	0.08

On verra que la proportion des décès est beaucoup plus élevée dans plusieurs des villes qu'elle ne devrait être, quoiqu'il y ait une légère diminution dans la proportion à la population de 28 villes nommées dans le tableau, soit 0.41 comparée avec 0.44 en 1888 et 0.55 en 1887. La proportion dans Ontario était de 0.28 par 1,000 habitants en 1888. La même année, la proportion en Angleterre était de 0.17 pour le pays entier et de 0.16 pour Londres. Ceci démontre ce que le soin qu'on porte aux mesures sanitaires peut accomplir.