

PROPORTION DES DÉCÈS CAUSÉS PAR LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR
1,000 AMES DANS LES VILLES SUIVANTES, EN 1890.

VILLES.	Par 1,000.	VILLES.	Par 1,000.
Winnipeg	1 09	Montréal.....	0 35
Saint-Jean, Qué	1 05	Woodstock, Ont.	0 35
Brantford.....	0 86	Québec.....	0 32
Saint-Thomas.....	0 67	Belleville	0 30
Toronto	0 65	Windsor.....	0 29
Kingston.....	0 52	Guelph.....	0 28
Hamilton.....	0 47	Saint-Jean, N.-B.....	0 26
Frédéricton.....	0 46	Charlottetown	0 26
Chatham, Ont.....	0 44	Peterborough.....	0 21
Victoria, C.-B.....	0 44	London	0 19
Saint-Hyacinthe.....	0 43	Halifax	0 18
Ottawa.....	0 43	Galt.....	0 13
Trois-Rivières.....	0 36	Belleville.....	0 11
Hull.....	0 36		

Il y a eu une augmentation dans la proportion par 1,000 de la population dans toutes les places nommées dans ce tableau de 41 à 43. Mais si on enlève Toronto on n'a plus qu'une proportion de 37. Tout de même cette proportion est encore plus élevée qu'ailleurs: En Angleterre la proportion n'était que de 17 en 1889. La proportion dans Ontario pour 1889 était de 26 par mille personnes.

Cause des
décès, par
classes
dans les
différentes
cités.

Le tableau suivant indique de quelle manière les causes des décès dans les villes nommées ont été réparties entre les diverses classes. La classification est basée sur celle qui a été établie par le Registre Général en Angleterre:—

VILLES.	Total, décès.	Zyootiques.	Parasitiques.	Ditéthétiques.	Constitution- nelles.	D'âges.	Locales.	Violences.	Causes indéfi- nies et non spé- cifiées.
Montréal.....	6,209	1,296	1	12	888	352	2,636	156	86%
Toronto.....	2,919	515	9	4	459	211	1,302	92	32%
Québec.....	2,116	555	...	4	256	235	783	34	24%
Hamilton.....	867	125	...	4	141	65	425	31	7%
Ottawa.....	948	217	...	6	148	91	380	33	7%
Saint-Jean, N.-B.....	741	126	130	64	320	37	6%
Halifax.....	1,089	306	1	2	155	67	448	21	8%
London.....	359	57	67	43	162	8	2%
Winnipeg.....	403	117	2	1	63	15	154	21	3%
Victoria, C.-B.....	275	44	1	2	44	17	124	17	2%
Kingston.....	383	58	...	1	55	60	144	18	4%
Hull.....	384	64	22	17	111	8	16%