

Le procédé ci-dessus décrit a été appliqué à la population de huit provinces canadiennes dans le tableau 23; on y verra que le taux brut de la mortalité dans les provinces maritimes et Ontario, comparativement élevé, en raison de l'âge de leur population, est sensiblement abaissé lorsqu'il est ajusté au "standard million". Mais il en est autrement dans les provinces des prairies et la Colombie Britannique où le taux brut de la mortalité est plutôt bas, en raison surtout de l'âge particulièrement favorable de la population de ces provinces. Pour l'ensemble des huit provinces, le taux ajusté de la mortalité est quelque peu inférieur au taux brut, ce qui indique que l'âge de notre population est un peu moins avantageux à une basse mortalité qu'il ne l'était dans le "standard million" d'Angleterre et du pays de Galles, au recensement de 1901.

**23.—Taux brut et taux ajusté de la mortalité, par provinces et par sexes, dans huit provinces, en 1922-1924.**

| Provinces.                    | 1922.           |                |        | 1923.           |                |        | 1924.           |                |        |
|-------------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------|
|                               | Mas-<br>culine. | Fémi-<br>nine. | Total. | Mas-<br>culine. | Fémi-<br>nine. | Total. | Mas-<br>culine. | Fémi-<br>nine. | Total. |
| Ile du Pr.-Edouard—           |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 13.1            | 12.0           | 12.6   | 12.4            | 13.8           | 13.1   | 11.0            | 10.7           | 10.9   |
| Ajusté.....                   | 9.8             | 8.8            | 9.3    | 9.1             | 10.2           | 9.7    | 8.4             | 8.0            | 8.3    |
| Nouvelle-Ecosse—              |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 13.1            | 12.2           | 12.6   | 13.3            | 12.6           | 13.0   | 12.7            | 11.9           | 12.3   |
| Ajusté.....                   | 11.1            | 9.9            | 10.5   | 11.2            | 10.1           | 10.7   | 10.8            | 9.9            | 10.3   |
| Nouveau-Brunswick             |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 13.5            | 12.8           | 13.2   | 13.0            | 12.3           | 12.7   | 12.9            | 11.7           | 12.3   |
| Ajusté.....                   | 11.9            | 11.4           | 11.7   | 11.5            | 10.9           | 11.2   | 11.2            | 10.2           | 10.7   |
| Ontario—                      |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 11.7            | 11.1           | 11.4   | 12.1            | 11.5           | 11.8   | 11.1            | 10.5           | 10.8   |
| Ajusté.....                   | 10.8            | 9.9            | 10.4   | 11.1            | 10.3           | 10.7   | 10.3            | 9.5            | 9.9    |
| Manitoba—                     |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 6.4             | 9.0            | 9.2    | 8.8             | 7.9            | 8.4    | 8.0             | 7.5            | 7.8    |
| Ajusté.....                   | 10.2            | 10.0           | 10.1   | 9.7             | 8.9            | 9.3    | 8.7             | 8.2            | 8.5    |
| Saskatchewan—                 |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 7.9             | 7.6            | 7.8    | 7.9             | 7.6            | 7.8    | 7.1             | 7.0            | 7.1    |
| Ajusté.....                   | 9.2             | 8.7            | 8.9    | 9.2             | 8.6            | 8.9    | 8.1             | 7.9            | 8.0    |
| Alberta—                      |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 8.9             | 8.3            | 8.6    | 8.4             | 7.7            | 8.1    | 7.7             | 7.5            | 7.6    |
| Ajusté.....                   | 10.2            | 9.7            | 9.9    | 9.8             | 9.1            | 9.5    | 9.6             | 8.4            | 8.5    |
| Colombie Britann.—            |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 10.1            | 7.8            | 9.1    | 10.1            | 8.0            | 9.2    | 10.0            | 7.9            | 9.0    |
| Ajusté.....                   | 10.7            | 8.7            | 9.7    | 10.8            | 9.0            | 9.8    | 10.4            | 8.6            | 9.5    |
| Canada (huit pre-<br>vinces)— |                 |                |        |                 |                |        |                 |                |        |
| Brut.....                     | 10.8            | 10.2           | 10.5   | 10.9            | 10.3           | 10.6   | 10.1            | 9.5            | 9.8    |
| Ajusté.....                   | 10.6            | 9.8            | 10.2   | 10.6            | 9.9            | 10.3   | 9.9             | 9.1            | 9.4    |

**Causes des décès.**—Plus de 80 p.c. de tous les décès constatés dans le territoire d'enregistrement, de 1921 à 1925, sont attribués aux 26 causes spécifiées dans les tableaux 24 et 25.

Les maladies ayant aggravé leurs ravages dans cette période sont l'influenza, le cancer, le diabète, l'anémie-chlorose, les affections du cœur et des artères, l'appendicite, les difformités congénitales, les suicides et autres morts violentes. Au contraire, il y eut diminution dans les décès causés par la fièvre typhoïde, la diphtérie, la tuberculose, la méningite, l'apoplexie, la paralysie, la bronchite, la pneumonie, la diarrhée et l'entérite, les maladies du premier âge et la sénilité.

Il est à remarquer que la rubrique intitulée "maladies mal définies" décroît de plus en plus d'importance, ce qui dénote plus d'exactitude dans les diagnostics et, par conséquent, dans les statistiques. (Tableau 24).