27.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances d'enfants vivants, en 1921-1925.

Provinces.	Décès d'enfants.					Taux de la mortalité infantile par 1,000 naissances.				
	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.	nomb.					
Ile du Prince-Edouard Nouvelle-Ecosse Nouveau-Brunswick Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie Britannique	1,299 6,763 1,533 1,814 1,391	1,239 1,194 5,921 1,669 1,913 1,475	1,139 1,135 5,950 1,411 1,925 1,418	1,118 1,098 5,418 1,173 1,634 1,227	887 1,096 5,530 1,184 1,659	100·7 113·3 91·2 83·0 80·6 84·0	97.6 103.3 82.9 94.4 85.6 91.3	97.5 106.0 84.9 85.7 91.9 94.2	94·7 102·5 75·8 75·9 75·9 84·1	77 · 8 100 · 3 78 · 9
Canada (huit provinces) Québec	14,893 11,387	14,256 11,297	13,822 11,011	12,375 10,334	12,155	88·1 128·3	86·8 127·8			
Canada (à l'exclusion des Terri- toires)	26, 280	25,553	24,833	22,709		102.0	101.2	103.2	92.9	_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les chiffres de 1925 sont sujets à revision.

Mortalité infantile, par causes.—Ainsi qu'on le verra par le tableau 28, treize principales causes de décès revendiquent environ 85 p.c. de la mortalité infantile constatée dans les huit provinces, de 1921 à 1924. A elles seules, trois causes, dont la source remonte à la naissance même, savoir: naissance prématurée et blessures à la naissance, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, ont déterminé plus de 47 p.c. de la mortalité infantile de 1924; en fait, cette année-là, 52·95 p.c. des enfants décédés étaient âgés de moins d'un mois et 37·7 p.c. de moins d'une semaine. (Voir tableau 29.).

28.—Mortalité infantile par sexe et par causes principales, avec pourcentage et taux de chaque cause, 1921-1924.

Causes des décès.	Année.	Gargons.	Filles.	Total.	Pourcen- tage de chaque cause.	Taux par 1,000 naissances vivantes.
Naissance prématurée, blessures	4604	4.000	4 001	0.050	21.8	19.3
à la naissance	1921 1922	1,862 2,013	1,391 1,494	$\frac{3,253}{3,507}$	21.8	21.4
	1922	2,013	1,485	3,512	25.4	22.4
	1924	1,989	1,578	3,567	28.8	22.6
Diarrhée et entérite	1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
	1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
	1923	864	577	1,441	10.4	9·2 8·5
Dibilité ser rénitale	1924 1921	$\frac{767}{1,322}$	572 943	1,339 2,265	10·8 15·2	13.4
Débilité congénitale	1922	1.154	815	1,969	13.8	12.0
	1923	938	662	1,600	11-6	10.2
	1924	738	590	1,328	10.7	8.4
Pneumonie	1921	918	676	1,594	10.7	9.4
	1922	901	670	1,574	11·0 12·5	9.6 11.1
	1923 1924	978 794	756 576	1,734 1,370	11.1	8.7
Bronchite	1921	150	116	266	1.8	1.6
Dioletite	1922	105	96	201	1 - 4	1.2
	1923	118	97	215	1.6	1.4
	1924	76	48	124	1.0	0.8
Vices de conformation congéni-	1001	470	363	833	5.6	4.9
taux	1921 1922	506	387	893	6.3	5.4
	1923	488	434	922	6.7	5.9
	1924	552	421	973	7.9	6.2
Convulsions		335	207	542	3.6	3.2
	1922	292	208	500	3.5	3·1 2·5
	1923	227	170	397 373	$\frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 0}$	
	1924	231	142	3/3	0.0	2.4