

Groupes d'âge.	Deux sexes.	Masculin.	Féminin.
Tous âges.....	1,000,000	483,543	516,457
Au-dessous de 5 ans.....	114,262	57,039	57,223
De 5 à 9 ans.....	107,209	53,462	53,747
De 10 à 14 ans.....	102,735	51,370	51,365
De 15 à 19 ans.....	99,796	49,420	50,376
De 20 à 24 ans.....	95,946	45,273	50,673
De 25 à 34 ans.....	161,579	76,425	85,154
De 35 à 44 ans.....	122,849	59,394	63,455
De 45 à 54 ans.....	89,222	42,924	46,298
De 55 à 64 ans.....	59,741	27,913	31,828
De 65 à 74 ans.....	33,080	14,691	18,389
De 75 ans et plus.....	13,581	5,632	7,949

Le procédé ci-dessus décrit a été appliqué à la population de huit provinces canadiennes dans le tableau 23; on y verra que le taux brut de la mortalité dans les provinces maritimes et Ontario, comparativement élevé, en raison de l'âge de leur population, est sensiblement abaissé lorsqu'il est ajusté au "standard million". Mais il en est autrement dans les provinces des prairies et la Colombie Britannique où le taux brut de la mortalité est plutôt bas, en raison surtout de l'âge particulièrement favorable de la population de ces provinces. Pour l'ensemble des huit provinces, le taux ajusté de la mortalité est quelque peu inférieur au taux brut, ce qui indique que l'âge de notre population est un peu moins avantageux à une basse mortalité qu'il ne l'était dans le "standard million" d'Angleterre et du pays de Galles au recensement de 1901.

23.—Taux brut et taux ajusté de la mortalité, par provinces et par sexes, dans huit provinces, en 1923-1925.

Provinces.	1923.			1924.			1925.		
	Masculine.	Féminine.	Total.	Masculine.	Féminine.	Total.	Masculine.	Féminine.	Total.
Ile du Pr.-Edouard—									
Brut.....	12.4	13.8	13.1	11.0	10.7	10.9	11.6	11.3	11.5
Ajusté.....	9.1	10.2	9.7	8.4	8.0	8.3	8.9	8.5	8.7
Nouvelle-Ecosse—									
Brut.....	13.3	12.6	13.0	12.7	11.9	12.3	11.3	11.3	11.3
Ajusté.....	11.2	10.1	10.7	10.8	9.9	10.3	9.6	9.4	9.5
Nouv.-Brunswick—									
Brut.....	13.0	12.3	12.9	12.9	11.7	12.3	12.8	11.8	12.3
Ajusté.....	11.5	10.9	11.2	11.2	10.2	10.7	11.1	10.2	10.7
Ontario—									
Brut.....	12.1	11.5	11.8	11.1	10.5	10.8	11.2	10.7	10.9
Ajusté.....	11.1	10.3	10.7	10.3	9.5	9.9	11.3	9.7	10.0
Manitoba—									
Brut.....	9.0	8.1	8.6	8.2	7.7	8.0	8.8	7.8	8.3
Ajusté.....	9.8	8.9	9.4	8.9	8.4	8.7	9.6	8.5	9.1
Saskatchewan—									
Brut.....	8.0	7.7	7.9	7.3	7.2	7.2	7.3	6.5	6.9
Ajusté.....	9.1	8.6	8.9	8.3	8.1	8.1	8.3	7.3	7.7
Alberta—									
Brut.....	8.7	8.0	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	7.4	7.8
Ajusté.....	10.8	9.0	9.4	9.6	9.0	9.1	10.1	8.3	8.7
Colombie Britan.—									
Brut.....	10.1	8.0	9.2	10.0	7.9	9.0	9.7	7.7	8.8
Ajusté.....	10.8	9.0	9.8	10.4	8.6	9.5	10.1	8.4	9.2
Canada (huit provinces)—									
Brut.....	10.9	10.3	10.2	10.2	9.7	9.9	10.2	9.5	9.9
Ajusté.....	10.7	9.9	10.0	10.0	9.3	9.5	10.0	9.1	9.5

Causes des décès.—Plus de 80 p.c. de tous les décès constatés dans le territoire d'enregistrement, de 1921 à 1925, sont attribués aux 30 causes spécifiées dans les tableaux 24 et 25. Les tableaux sont suivis de notes sur les principales causes de décès.

Il est à remarquer que la rubrique intitulée "maladies mal définies" décroît de plus en plus, ce qui dénote plus d'exactitude dans les diagnostics et, par conséquent, dans les statistiques. (Tableau 24).