

Le procédé ci-dessus décrit a été appliqué à la population de huit provinces canadiennes dans le tableau 21; on y verra que le taux brut de la mortalité dans les Provinces Maritimes et l'Ontario, comparativement élevé, en raison de l'âge de leur population, est sensiblement abaissé lorsqu'il est ajusté au "standard million". Mais il en est autrement dans les Provinces des Prairies et la Colombie Britannique où le taux brut de la mortalité est plutôt bas, en raison surtout de l'âge particulièrement favorable de la population de ces provinces. Pour l'ensemble des huit provinces, le taux ajusté de la mortalité est quelque peu inférieur au taux brut, ce qui indique que l'âge de notre population est un peu moins avantageux à une basse mortalité qu'il ne l'était dans le "standard million" d'Angleterre et du pays de Galles au recensement de 1901.

Avec l'inclusion du Québec, en 1926, les taux bruts de mortalité pour tout le Canada sont, par 1,000, pour les deux sexes, 11.5; 11.8 pour les hommes et 11.1 pour les femmes et les taux ajustés, de 11.1, 11.6 et 10.7 respectivement. Pour la province de Québec les taux bruts sont en 1926: pour les deux sexes, 14.5, pour les hommes 15.0 et pour les femmes 14.1, et les taux ajustés, 14.0, 14.4 et 13.7 respectivement.

**21.—Taux brut et taux ajusté de la mortalité, dans l'ancien territoire d'enregistrement par provinces et par sexes, 1924-1926.**

Provinces.	1924.			1925.			1926.		
	Mas-culine.	Fémi-nine.	Total.	Mas-culine.	Fémi-nine.	Total.	Mas-culine.	Fémi-nine.	Total.
Île du Pr.-Édouard.									
Brut.....	11.0	10.7	10.9	11.6	11.3	11.5	10.3	10.4	10.3
Ajusté.....	8.4	8.0	8.3	8.9	8.5	8.7	7.9	7.8	7.8
Nouvelle-Écosse.....									
Brut.....	12.7	11.9	12.3	11.3	11.3	11.3	12.3	11.3	11.8
Ajusté.....	10.8	9.9	10.3	9.6	9.4	9.5	10.5	9.4	9.9
Nouv.-Brunswick—									
Brut.....	12.9	11.7	12.3	12.8	11.8	12.3	12.6	12.0	12.3
Ajusté.....	11.2	10.2	10.7	11.1	10.2	10.7	10.9	10.4	10.7
Ontario—									
Brut.....	11.1	10.5	10.8	11.2	10.7	10.9	11.8	11.0	11.4
Ajusté.....	10.3	9.5	9.9	11.3	9.7	10.0	10.9	9.9	10.4
Manitoba—									
Brut.....	8.2	7.7	8.0	8.8	7.8	8.3	8.8	7.8	8.3
Ajusté.....	8.9	8.4	8.7	9.6	8.5	9.1	9.4	8.7	9.0
Saskatchewan—									
Brut.....	7.3	7.2	7.2	7.3	6.5	6.9	7.6	7.1	7.4
Ajusté.....	8.3	8.1	8.1	8.3	7.3	7.7	8.7	8.3	8.5
Alberta—									
Brut.....	8.2	8.0	8.1	8.1	7.4	7.8	8.8	8.1	8.5
Ajusté.....	9.6	9.0	9.1	10.1	8.3	8.7	10.1	9.4	9.7
Colombie Britan.—									
Ajusté.....	10.0	7.9	9.0	9.7	7.7	8.8	10.5	8.6	9.6
Brut.....	10.4	8.6	9.5	10.1	8.4	9.2	11.0	9.3	10.1
<b>Canada (huit provinces)—</b>									
<b>Brut.....</b>	<b>10.2</b>	<b>9.7</b>	<b>9.9</b>	<b>10.2</b>	<b>9.5</b>	<b>9.9</b>	<b>10.6</b>	<b>9.9</b>	<b>10.3</b>
<b>Ajusté.....</b>	<b>10.0</b>	<b>9.3</b>	<b>9.5</b>	<b>10.0</b>	<b>9.1</b>	<b>9.5</b>	<b>10.4</b>	<b>9.5</b>	<b>9.9</b>

**Causes des décès.**—Plus de 80 p.c. de tous les décès constatés dans le territoire d'enregistrement, de 1921 à 1927, sont attribués aux 30 causes spécifiées dans les tableaux 22 et 23.

Il est à remarquer que la rubrique intitulée "maladies mal définies" décroît de plus en plus, ce qui dénote plus d'exactitude dans les diagnostics et, par conséquent, dans les statistiques. (Tableau 22).