

28.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1926-31 et moyennes en 1921-25 et 1926-30.

A.—DÉCÈS D'ENFANTS.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	151	1,139	1,165	1	5,916	1,394	1,789	1,327	621	1
Moyenne 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
1926.....	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588	23,692
1927.....	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606	22,010
1928.....	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524	21,195
1929.....	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575	21,674
1930.....	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562	21,742
1931.....	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	20,360

B.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	76.8	93.7	105.0	1	82.7	83.7	83.0	85.8	60.6	1
Moyenne 1926-30.....	70.6	84.8	100.7	127.1	74.1	71.6	73.3	75.5	55.2	93.3
1926.....	70.2	80.3	105.9	142.0	78.4	76.5	81.1	85.3	58.4	101.8
1927.....	66.6	92.3	96.0	129.3	71.1	72.2	74.0	74.5	60.1	94.0
1928.....	50.9	79.1	95.6	123.6	71.2	67.0	64.4	76.5	50.5	89.5
1929.....	89.8	89.8	106.5	120.5	76.0	70.6	73.3	77.4	55.4	92.1
1930.....	75.5	82.6	99.5	120.1	73.8	71.8	72.6	63.6	51.7	89.3
1931.....	68.1	78.7	87.4	112.9	69.8	64.3	68.6	69.4	49.4	84.7

¹ Québec n'est pas compris dans le territoire d'enregistrement antérieurement à 1926.

² Sans compter les Territoires.

Mortalité infantile par causes.—De 1926 à 1931, comme le montre le tableau 29, 21 principales causes de décès ont contribué de 91 à 93 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, conséquences de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de plus de 43 p.c. des décès d'enfants en 1931. L'année précédente 47 p.c. de tous les décès d'enfants étaient d'enfants ayant moins d'un mois, et 34 p.c. ayant moins d'une semaine, comme le montre le tableau 30.

29.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926 et 1929-31.

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-9, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par causes de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2. Pour les chiffres de 1927 et 1928 relatifs au Canada entier, voir pp. 143-5 de l'Annuaire de 1932.

Cause de décès.	N° de la liste internationale.	Année.	Nombre.			Taux par 100,000.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
Rougeole.....	7	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1929	88	84	172	73	73	73	0.8
		1930	119	93	212	95	78	87	1.0
		1931	29	27	56	23	23	23	0.3
Scarlatine.....	8	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1929	10	10	20	8	9	8	0.1
		1930	17	13	30	14	11	12	0.1
		1931	7	7	14	6	6	6	0.1
Coqueluche.....	9	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1929	231	223	454	191	195	193	2.1
		1930	345	341	686	276	287	282	3.2
		1931	243	259	502	197	222	209	2.5
Diphthérie.....	10	1926	24	23	47	20	20	20	0.2
		1929	22	21	43	18	18	18	0.2
		1930	29	20	49	23	17	20	0.2
		1931	30	24	54	24	21	22	0.3
Influenza.....	11	1926	576	374	950	481	331	408	4.0
		1929	686	543	1,229	567	474	522	5.7
		1930	284	186	470	227	157	193	2.2
		1931	372	319	691	301	273	287	3.4
Erysipèle.....	15	1926	51	50	101	43	44	43	0.4
		1929	55	45	100	45	39	42	0.5
		1930	49	34	83	39	29	34	0.4
		1931	35	28	63	28	24	26	0.3