

23.—Taux bruts et taux ajustés de mortalité au Canada, par provinces, 1921-32—fin.

Province.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.
Nouveau-Brunswick—												
Taux brut.....	14.2	13.3	12.9	12.6	12.6	12.6	12.3	12.4	12.9	12.3	11.4	11.0
Taux ajusté.....	12.4	11.8	11.3	11.0	11.0	11.0	10.7	10.8	11.2	10.7	9.8	9.4
Ontario—												
Taux brut.....	11.8	11.4	11.8	10.8	10.9	11.3	10.8	11.3	11.4	11.0	10.4	10.5
Taux ajusté.....	10.8	10.4	10.7	9.7	9.8	10.0	9.5	9.9	9.9	9.5	8.9	8.8
Manitoba—												
Taux brut.....	8.8	9.3	8.6	8.0	8.3	8.3	8.2	8.1	8.6	8.3	7.6	7.5
Taux ajusté.....	9.6	10.3	9.4	8.7	9.0	9.0	8.7	8.6	9.0	8.6	7.9	7.8
Saskatchewan—												
Taux brut.....	7.4	8.0	7.9	7.3	7.0	7.4	7.2	7.2	7.6	7.0	6.6	6.5
Taux ajusté.....	8.3	9.1	9.0	8.3	8.0	8.5	8.2	8.1	8.6	7.8	7.5	7.4
Alberta—												
Taux brut.....	8.4	8.9	8.4	8.1	7.8	8.5	8.0	8.7	9.1	7.8	7.2	7.5
Taux ajusté.....	9.4	10.3	9.6	9.3	8.9	9.7	9.1	9.7	10.2	8.5	8.0	8.4
Colombie Britannique—												
Taux brut.....	8.0	9.1	9.0	8.8	8.4	9.0	9.2	9.2	9.7	9.5	8.8	8.7
Taux ajusté.....	8.4	9.6	9.4	9.0	8.5	8.9	9.0	8.8	9.1	8.7	8.1	8.0
Canada (ancien territoire d'enregistrement)—												
Taux brut.....	10.6	10.6	10.7	10.0	9.9	10.3	9.9	10.2	10.5	10.0	9.4	9.4
Taux ajusté.....	10.2	10.3	10.3	9.5	9.4	9.7	9.3	9.5	9.8	9.2	8.6	8.5
Québec—												
Taux brut.....	1	1	1	1	1	14.3	13.6	13.5	13.4	12.7	12.0	11.4
Taux ajusté.....	1	1	1	1	1	13.9 ¹	13.2 ²	13.1 ²	13.1	12.4	11.7	11.1
Canada (à l'exclusion des Territoires)—												
Taux brut.....	1	1	1	1	1	11.4	10.9	11.1	11.3	10.7	10.1	9.9
Taux ajusté.....	1	1	1	1	1	10.8 ¹	10.4 ²	10.5 ²	10.7 ²	10.1	9.5	9.3

¹ Avant 1926 Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

² Révisé depuis la publication de l'Annuaire de 1933.

Causes de décès.—Plus de 86 pour cent des décès déclarés de 1931 à 1933 dans le territoire d'enregistrement actuel sont attribuables aux 32 causes spécifiées dans les tableaux 24 et 25. Dans ces tableaux les groupements de 1931-33 sont en conformité avec la liste internationale telle que révisée en 1929 et qui a été appliquée pour la première fois en 1931. Toutefois, dans certains cas, les chiffres des années antérieures à 1931 ne sont pas toujours absolument comparables avec ceux de ce groupement. Ces cas sont indiqués par le renvoi 2 du tableau 24. Le graphique accompagnant ces tableaux a pour but principal de donner le plus haut degré possible de comparabilité sur toute la période de 1926-33. Pour cette raison il a été nécessaire de sortir un peu du cadre des tableaux 24 et 25. Ces écarts sont indiqués par des astérisques dans le graphique. Le total des décès est moins élevé en 1933 que pour toute autre année dont on dispose de statistiques englobant toutes les provinces, y compris le Québec, donc depuis 1926. L'épidémie d'influenza qui sévissait en 1929 avait fait monter le total de cette année-là, mais les décès attribuables à cette cause sont devenus normaux depuis cette date. Il est cependant significatif que le cancer et les maladies des artères sont devenus des causes plus importantes de décès en dépit des efforts pour les contrôler. Les suicides montrent une amélioration depuis leur haut niveau de 1932. Les morts violentes autres que les suicides accusent une amélioration marquée depuis 1930.