

28.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1931-33 et moyenne en 1921-25 et 1926-30—fin.

B.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	76.8	93.7	105.0	1	82.7	83.7	83.0	85.8	60.6	1
Moyenne 1926-30.....	70.6	84.8	100.7	127.1	74.1	71.6	73.3	75.5	55.2	93.3
1931.....	68.1	78.7	87.4	112.9	69.8	64.3	68.6	69.4	49.4	84.7
1932.....	65.1	73.0	71.6	94.2	61.8	59.2	63.5	58.7	46.7	73.3
1933.....	60.6	70.9	81.8	94.5	59.8	63.4	61.1	59.9	45.8	73.1

¹ Le Québec n'est pas compris dans le territoire d'enregistrement antérieurement à 1926.

² Sans compter les Territoires.

Mortalité infantile par causes.—De 1926 à 1933, comme le montre le tableau 29, 21 principales causes de décès ont contribué de 91 à 93 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, conséquences de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de plus de 45 p.c. des décès d'enfants en 1933.

Ce pourcentage montre une amélioration sensible. Il était de 41.4 en 1926, et de 42.3 en 1930 et le fait que le total des décès d'enfants en bas âge a diminué de pas moins de 31 p.c. entre 1926 et 1933 indique une grande amélioration dans le soin des nouveau-nés. Pour les années 1931-32, 48.6 p.c. et 51.2 p.c., respectivement, de tous les décès d'enfants étaient d'enfants ayant moins d'un mois, et 34.1 p.c. et 36.5 p.c., respectivement, ayant moins d'une semaine, comme le montre le tableau 30.

29.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926 et 1931-33.

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-9, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par causes de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2. Pour les chiffres de 1927 et 1928 relatifs au Canada entier, voir pp. 143-5 de l'Annuaire de 1932 et pour 1929 et 1930, à pp. 179-180 de l'Annuaire de 1933.

Cause de décès.	N° de la liste internationale.	Année.	Nombre.			Taux par 100,000 naissances vivantes.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
Rougeole.....	7	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1931	29	27	56	23	23	23	0.3
		1932	61	58	119	50	51	50	0.7
		1933	33	27	60	29	25	27	0.4
Scarlatine.....	8	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1931	7	7	14	6	6	6	0.1
		1932	10	3	13	8	3	6	0.1
		1933	6	6	12	5	6	5	0.1
Coqueluche.....	9	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1931	243	259	502	197	222	209	2.5
		1932	163	176	339	135	154	144	2.0
		1933	186	202	388	163	186	174	2.4
Diphtérie.....	10	1926	24	23	47	20	20	20	0.2
		1931	30	24	54	24	21	22	0.3
		1932	13	14	27	11	12	11	0.2
		1933	14	5	19	12	5	9	0.1
Influenza ²	11	1926	576	374	950	481	331	408	4.0
		1931	372	319	691	301	273	287	3.4
		1932	383	284	667	316	248	283	3.9
		1933	412	335	747	360	309	335	4.6
Erysipèle.....	15	1926	51	50	101	43	44	43	0.4
		1931	35	28	63	28	24	26	0.3
		1932	37	31	68	31	27	29	0.4
		1933	24	36	60	21	33	27	0.4
Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë...	16	1926	6	3	9	5	3	4	0.3
		1931	7	13	20	6	11	8	0.1
		1932	15	4	19	12	3	8	0.1
		1933	3	2	5	3	2	2	1

Pour renvois, voir à la fin du tableau.