

Comme exemple, le taux de mortalité infantile à New-York était de 51 par 1,000 naissances vivantes en 1932 comparativement à un taux de 58 pour le territoire d'enregistrement des Etats-Unis. La même année, la mortalité infantile à Londres et à Berlin était de 67 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 69 pour les Iles Britanniques et 79 pour l'Allemagne. D'après les plus récentes statistiques, Vienne a un taux de 79 comparativement à 106 pour l'Autriche. D'autre part Paris avait en 1932 un taux de 85 comparativement à 76 pour la France la même année, la dernière sur laquelle ces statistiques ont été compilées.

Au Canada, Montréal a en 1932 une mortalité infantile de 100 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 94 pour la province de Québec. Toronto avait en 1932 une mortalité infantile de 62 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 62.1 pour la province d'Ontario, tandis que Winnipeg et Vancouver ont un taux de mortalité infantile beaucoup plus bas que ceux de leurs provinces respectives. En 1932 Victoria avait le taux le moins élevé du tableau, et depuis plusieurs années Vancouver et Victoria ont deux des plus faibles taux de mortalité infantile de l'univers.

33.—Taux de mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes dans les grandes villes de l'univers en 1932 ou année la plus récente.

Ville.	Année.	Taux de la mortalité infantile.	Ville.	Année.	Taux de la mortalité infantile.
Victoria, C.B.	1932	29	Verdun	1932	66
Auckland	1932	31	Berlin	1932	67
Amsterdam	1932	34	Londres, Ang.	1932	67
Wellington	1932	34	Birmingham	1932	68
Adelaide	1932	39	Saint-John	1932	69
Sydney, N.G.S.	1932	39	Saskatoon	1932	69
Stockholm	1932	41	Brandon	1932	73
Vancouver	1932	42	Edinburgh	1932	73
Winnipeg	1932	44	Sheffield	1932	73
Oso	1932	45	Washington	1932	73
Hobart	1932	48	Munich	1932	75
Melbourne	1932	48	Antwerp	1932	76
Perth, Australie occidentale	1932	48	Cologne	1932	76
Regina	1932	48	Halifax	1932	78
Calgary	1932	49	Vienne	1929	79
Chicago	1932	49	Ottawa	1932	81
Edmonton	1932	49	Leipzig	1932	83
Frankfort-on-Main	1932	49	Breslau	1932	84
Brisbane	1932	50	Paris	1932	85
New-York	1932	51	Manchester	1932	86
Copenhague	1932	52	Cork	1932	87
Windsor	1932	52	Johannesburg	1932	88
Moncton	1932	53	Liverpool	1932	91
Hamilton	1932	62	Prague	1929	98
Toronto	1932	62	Montréal	1932	100
Hamburg	1932	64	Glasgow	1932	112
Cape Town	1932	65	Québec	1932	135
Dresde	1932	66	Bombay	1932	218
London, Ont.	1932	66	Madras	1932	234

La grande réduction de la mortalité infantile au Canada depuis l'inauguration des statistiques vitales fédérales est remarquable. Ainsi, le taux de Toronto a baissé de 90 en 1921 à 60 en 1933 et celui de Winnipeg, de 78 à 39; celui de Vancouver de 56 à 34; d'Hamilton, de 88 à 57; d'Ottawa de 130 à 89; de London, de 92 à 64; d'Edmonton, de 89 à 53; d'Halifax, de 135 à 71; et de Saint John, de 147 à 93. Dans l'ensemble de 13 cités de 40,000 âmes et plus dans l'ancien territoire d'enregistrement au Canada, il y a eu en 1921 41,923 naissances vivantes et 3,833 décès d'enfants en bas âge, soit un taux de 91 par 1,000 naissances vivantes. En 1933 ces mêmes villes donnaient 34,856 naissances vivantes mais seulement 1,983 décès d'enfants en bas âge soit 57 par 1,000 naissances vivantes.