

27.—Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par causes principales, 1929-34.

NOTE.—Tous les taux ont été rajustés, à une décimale près, depuis la publication de l'Annuaire de 1934-35.

N° de la liste internationale. ¹	Énumération.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.	1934.
1, 2	Fièvre typhoïde.....	4.7	4.4	4.1	3.2	2.7	2.7
7	Rougeole.....	6.2	5.1	1.6	3.1	1.6	1.7
8	Scarlatine.....	4.4	3.9	2.4	1.9	1.5	2.1
9	Coqueluche.....	7.5	9.5	7.2	5.3	5.2	8.1
10	Diphthérie.....	9.8	7.2	6.2	3.8	2.2	2.1
11	Influenza ²	71.6	24.2	31.0	40.4	37.7	18.5
16	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë.....	1.5	2.1	2.2	1.6	0.7	0.8
17	Encéphalite léthargique ou épidémique.....	1.2	0.9	0.7	0.7	0.5	0.4
18	Méningite cérébrospinale ou épidémique.....	3.4	2.9	2.2	1.3	1.0	0.8
23	Tuberculose de l'appareil respiratoire ²	64.3	64.6	59.9	55.9	53.1	48.9
24-32	Tuberculose d'autres organes.....	13.3	14.7	13.6	12.4	12.0	10.6
45-53	Cancer.....	87.8	91.0	92.4	95.5	99.9	97.9
59	Diabète sucré.....	12.1	11.2	12.0	12.8	12.1	12.2
71	Anémie.....	6.9	7.3	6.9	6.9	6.9	5.7
82 a, b, c	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale.....	29.8	27.7	25.0	24.2	24.7	23.8
82d	Paralysies non spécifiées.....	9.8	8.9	7.0	6.2	5.2	5.1
86	Convulsions chez les enfants de moins de cinq ans.....	4.3	3.7	3.6	2.9	2.5	2.4
90-95	Maladies du cœur ²	131.8	128.2	132.5	146.1	145.2	151.3
96, 97	Maladies des artères ²	59.3	64.3	57.5	64.8	65.2	68.3
99, 102							
106	Bronchite.....	4.7	4.3	4.5	4.2	3.4	3.5
107-109	Pneumonie.....	84.3	72.0	67.7	67.1	60.8	60.4
119, 120	Diarrhée et entérite ²	49.0	59.0	49.8	35.6	31.8	34.5
121	Appendicite.....	14.5	14.6	13.5	13.9	13.6	14.6
122	Hernie, obstruction intestinale.....	9.6	9.4	9.5	9.0	9.6	9.9
130-132	Néphrite.....	56.8	54.6	49.9	53.7	51.7	52.2
137	Maladies de la prostate ²	7.4	7.9	7.2	8.4	8.7	8.7
140-150	Causes puerpérales.....	13.4	13.8	11.7	11.3	10.4	10.8
157	Vices de conformation congénitaux.....	14.6	14.5	13.8	12.9	12.9	12.6
158-161	Maladies infantiles ²	91.3	88.0	87.0	75.6	68.8	64.2
162	Sénilité.....	25.0	22.9	21.5	20.9	19.1	17.4
163-171	Suicides.....	8.3	9.9	9.7	9.8	8.6	8.6
173-198	Morts violentes (suicide excepté).....	63.1	63.4	59.5	53.6	49.6	51.3
	Autres causes spécifiées ²	150.0	146.3	124.6	120.3	117.6	118.9
	Totaux, causes spécifiées.....	1,121.6	1,062.4	998.0	985.2	946.6	931.0
199, 200	Causes de décès indéterminées.....	11.7	9.7	10.6	9.6	9.3	8.7
	Totaux, mortalité par 100,000 habitants.....	1,133.3	1,072.2	1,008.6	994.8	955.9	939.7

¹ Voir les renvois au bas du tableau 26.

Mortalité dans les villes du Canada.—Le tableau 28 donne le nombre de décès de 1929 à 1934 dans les villes canadiennes de 10,000 habitants et plus. On peut dire que la mortalité en 1929 a été élevée, 113,515 décès ayant été déclarés contre 105,292 en 1927 et une moyenne de 108,924 pour la période 1926-30.

Dans la plupart des villes, on enregistre en 1929 un accroissement correspondant de décès. Il est tout probable que par rapport à la population totale, la proportion d'habitants dans ces villes et cités est plus élevée en 1934 qu'en 1929 et que le nombre de non domiciliés hospitalisés dans ces centres et décédés au cours de l'année a également augmenté.

En face de ces probabilités il est intéressant de noter que seulement 18 des 70 villes figurant au tableau accusent en 1934 des augmentations de décès comparativement à 1930. Les plus grandes villes ne sont pas de ce nombre; au contraire, elles montrent des progrès substantiels.