

30.—Mortalité infantile, par provinces, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1931-34 et moyennes en 1921-25 et 1926-30.

A.—DÉCÈS D'ENFANTS.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ²
Moyenne 1921-25.....	151	1,139	1,165	¹	5,916	1,394	1,789	1,327	621	¹
Moyenne 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
1931.....	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	20,360
1932.....	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	937	477	17,263
1933.....	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	16,284
1934.....	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426	15,870

B.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES.

Année.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ¹
Moyenne 1921-25.....	77	94	105	¹	83	84	83	86	61	¹
Moyenne 1926-30.....	71	85	101	127	74	72	73	75	55	93
1931.....	68	79	87	113	70	64	69	69	49	85
1932.....	65	73	72	94	62	59	63	59	47	73
1933.....	61	71	82	95	60	63	61	60	46	73
1934.....	67	71	86	97	57	55	55	55	43	72

¹ Le Québec n'est pas compris dans le territoire d'enregistrement antérieurement à 1926.

² Sans compter les Territoires.

Mortalité infantile par causes.—De 1926 à 1934, comme le montre le tableau 31, 21 principales causes de décès ont contribué de 91 à 93 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, conséquence de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de plus de 44 p.c. des décès d'enfants en 1934.

Ce pourcentage montre une amélioration sensible. Il était de 41.4 en 1926, et de 42.3 en 1930 et le fait que le total des décès d'enfants en bas âge a diminué de pas moins de 33 p.c. entre 1926 et 1934 indique une grande amélioration dans le soin des nouveau-nés. Pour l'année 1934, 50.8 p.c. de tous les décès d'enfants étaient des enfants ayant moins d'un mois, et 36.4 p.c. ayant moins d'une semaine, comme le montre le tableau 32.

31.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926 et 1933-34.

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-9, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par causes de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2. Pour les chiffres de 1927 et 1928 relatifs au Canada entier, voir pp. 143-5 de l'Annuaire de 1932, pour 1929 et 1930, à pp. 179-180 de l'Annuaire de 1933 et pour 1931 et 1932 à pp. 204-205 de l'Annuaire de 1934-35.

Cause de décès.	N ^o de la liste internationale.	Année.	Nombre.			Taux par 100,000 naissances vivantes.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
Rougeole.....	7	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1933	33	27	60	29	25	27	0.4
		1934	43	30	73	38	28	33	0.5
Scarlatine.....	8	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1933	6	6	12	5	6	5	0.1
		1934	6	1	7	5	1	3	0.1
Coqueluche.....	9	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1933	186	202	388	163	186	174	2.4
		1934	296	309	605	261	286	273	3.8

Pour renvois, voir à la fin du tableau, p. 184.