

**23.—Mortalité infantile, par province, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1931-35 et moyennes en 1921-25, 1926-30 et 1931-35.**

## A.—DÉCÈS D'ENFANTS.

Année.	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. <sup>2</sup>
Moyennes, 1921-25.....	151	1,139	1,165	1	5,916	1,394	1,789	1,327	621	1
Moyennes, 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
Moyennes, 1931-35.....	131	840	857	7,756	3,962	835	1,261	998	464	17,104
1931.....	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	20,360
1932.....	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477	17,263
1933.....	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	16,284
1934.....	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426	15,870
1935.....	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460	15,730

## B.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES.

Année.	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. <sup>2</sup>
Moyennes, 1921-25.....	77	94	105	1	83	84	83	86	61	1
Moyennes, 1926-30.....	71	85	101	127	74	72	73	75	55	93
Moyennes, 1931-35.....	67	73	82	98	61	61	62	60	46	75
1931.....	68	79	87	113	70	64	69	69	49	85
1932.....	65	73	72	94	62	59	63	59	47	73
1933.....	61	71	82	95	60	63	61	60	46	73
1934.....	67	71	86	97	57	55	55	55	43	72
1935.....	72	72	83	92	56	63	61	58	46	71

<sup>1</sup> Antérieurement à 1926 Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

<sup>2</sup> Moins les Territoires.

**Mortalité infantile par causes.**—De 1926 à 1935, comme le montre le tableau 24, 21 principales causes de décès ont contribué de 91 à 92 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, conséquence de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de 44 p.c. des décès d'enfants en 1935. Ce pourcentage montre une augmentation très marquée au cours des années étudiées ici. En 1926 il était de 41.4 et en 1930 de 42.3, et comme le total des décès d'enfants a diminué de pas moins de 34 p.c. depuis 1926 il est évident que les méthodes de soins post-nataux des enfants ont fait des progrès. En 1934 et 1935, 49.0 et 49.2 p.c. respectivement de tous les nouveau-nés décédés étaient âgés de moins d'un mois, et 34.9 p.c. et 35.3 p.c. respectivement, étaient âgés de moins d'une semaine, comme l'indique le tableau 25.

**24.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926 et 1934-35.**

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-9, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par causes de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2. Pour les chiffres de 1927 et 1928 relatifs au Canada entier, voir pp. 143-5 de l'Annuaire de 1932; pour 1929 et 1930, à pp. 179-180 de l'Annuaire de 1933 et pour 1931, 1932 et 1933 à pp. 204-205 de l'Annuaire de 1934-35.

N° de la liste internationale.	Cause de décès.	Année.	Nombre.			Taux par 100,000 naissances vivantes.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
7	Rougeole.....	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1934	43	30	73	38	28	33	0.5
		1935	104	77	181	92	71	82	1.2
8	Scarlatine.....	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1934	6	7	13	5	6	6	0.1
		1935	8	7	15	7	6	7	0.1
9	Coqueluche.....	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1934	296	309	605	261	286	273	3.8
		1935	318	281	599	281	260	270	3.8