

### Sous-section 2.—Mortalité infantile et mortalité puerpérale.

En ces dernières années la science médicale a consacré une grande partie de ses efforts à la lutte contre la mortalité infantile et il est reconnu que ce travail a été couronné de succès. Au Canada, les autorités sanitaires, tant fédérales que provinciales ou municipales, ont lutté énergiquement pour réduire la mortalité infantile et, en l'absence d'épidémies, chaque année montre une amélioration sur la précédente. Dans les dix-sept années depuis l'institution des statistiques vitales, nous avons la preuve d'un déclin très considérable de la mortalité infantile, bien que celle-ci ait été plus élevée en 1937 qu'en 1936. En 1921 le taux de mortalité infantile au Canada (pour le Québec, on s'est servi des chiffres fournis par la province) était de 102 par 1,000 naissances vivantes. Il était abaissé à 76 en 1937. Le tableau 23 donne les chiffres pour tout le Canada depuis 1931 jusqu'à 1937 et les moyennes pour les quinquennats de 1921-25, 1926-30 et 1931-35. La mortalité infantile dans le Québec, qui était plus élevée que dans toutes les autres provinces dans le passé, est plus basse qu'au Nouveau-Brunswick en 1937. Une analyse des taux y indique un progrès continu depuis les onze années que la province est incorporée au territoire d'enregistrement. On peut dire que près de 7,000 bébés, qui en 1926 auraient été fauchés par la mort, ont été sauvés au Canada en 1937.

### 23.—Mortalité infantile, par province, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 1931-37 et moyennes en 1921-25, 1926-30 et 1931-35.

Année.	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. <sup>1</sup>
A.—DÉCÈS D'ENFANTS.										
Moyennes, 1921-25.....	151	1,139	1,165	2	5,916	1,394	1,789	1,327	621	2
Moyennes, 1926-30.....	122	934	1,039	10,518	5,091	1,031	1,559	1,195	571	22,060
Moyennes, 1931-35.....	131	840	857	7,756	3,962	835	1,261	998	464	17,104
1931.....	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	20,360
1932.....	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477	17,263
1933.....	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	16,284
1934.....	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426	15,870
1935.....	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460	15,730
1936.....	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	14,574
1937.....	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	16,693

### B.—TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES.

Moyennes, 1921-25.....	77	94	105	2	83	84	83	86	61	2
Moyennes, 1926-30.....	71	85	101	127	74	72	73	75	55	93
Moyennes, 1931-35.....	67	73	82	98	61	61	62	60	46	75
1931.....	68	79	87	113	70	64	69	69	49	85
1932.....	65	73	72	94	62	59	63	59	47	73
1933.....	61	71	82	95	60	63	61	60	46	73
1934.....	67	71	86	97	57	55	55	55	43	72
1935.....	72	72	83	92	56	63	61	58	46	71
1936.....	69	66	77	83	55	61	54	60	44	66
1937.....	73	70	101	100	55	64	67	63	56	76

<sup>1</sup> Moins les Territoires.

<sup>2</sup> Antérieurement à 1926 Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

**Mortalité infantile par causes.**—De 1926 à 1937, comme le montre le tableau 24, 21 principales causes de décès ont contribué de 91 à 92 p.c. de la mortalité infantile au Canada. Il est à remarquer que quatre causes dont la source remonte à la naissance même, c'est-à-dire, naissance prématurée, conséquence de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de 40 p.c. des décès d'enfants en 1937. En 1926 il était de