

41.4 et en 1930 de 42.3 et comme le total des décès d'enfants a diminué de près de 30 p.c. depuis 1926 il est évident que les méthodes de soins post-nataux des enfants ont fait des progrès. En 1936 et 1937, 50.7 et 45.1 p.c. respectivement de tous les nouveau-nés décédés étaient âgés de moins d'un mois et 37.2 p.c. et 32.5 p.c. respectivement, étaient âgés de moins d'une semaine, comme l'indique le tableau 25.

24.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926 et 1936-37.

NOTA.—Dans l'Annuaire de 1927-28, pp. 188-189, se trouvent les chiffres des années 1921 à 1924, par cause de décès. Les chiffres de 1925 à 1927 sont donnés dans l'Annuaire de 1929, pp. 181-2. Pour les chiffres de 1927 et 1928 relatifs au Canada entier, voir pp. 143-145 de l'Annuaire de 1932; pour 1929 et 1930, pp. 179-180 de l'Annuaire de 1933; pour 1931, 1932 et 1933 pp. 204-205 de l'Annuaire de 1934-35; pour 1934 pp. 183-184 de l'Annuaire de 1936 et pour 1935, pp. 188-189 de l'Annuaire de 1938.

N° de la liste internationale.	Nomenclature.	Année.	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
7	Rougeole.....	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1936	66	49	115	58	46	52	0.8
		1937	158	110	268	140	103	122	1.6
8	Scarlatine.....	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1936	7	4	11	6	4	5	0.1
		1937	6	5	11	5	5	5	0.1
9	Coqueluche.....	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1936	203	189	392	179	177	178	2.7
		1937	216	269	485	191	251	220	2.9
10	Diphthérie.....	1926	24	23	47	20	20	20	0.2
		1936	8	3	11	7	3	5	0.1
		1937	10	14	24	9	13	11	0.1
11	Influenza ¹	1926	576	374	950	481	331	408	4.0
		1936	344	232	576	304	217	261	4.0
		1937	545	394	939	482	368	426	5.6
15	Erysipèle.....	1926	51	50	101	43	44	43	0.4
		1936	42	27	69	37	25	31	0.5
		1937	13	9	22	11	8	10	0.1
16	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite aiguë.....	1926	6	3	9	5	3	4	0.3
		1936	1	3	4	1	3	2	0.1
		1937	7	2	9	6	2	4	0.1
18	Méningite cérébrospinale épidémique.....	1926	33	24	57	28	21	24	0.2
		1936	11	4	15	10	4	7	0.1
		1937	12	12	24	11	11	11	0.1
23-32	Tuberculose ¹	1926	131	102	233	109	90	100	1.0
		1936	93	65	158	82	61	72	1.1
		1937	85	64	149	75	60	68	0.9
34	Syphilis.....	1926	68	60	128	57	53	55	0.5
		1936	118	89	207	104	83	94	1.4
		1937	121	81	202	107	76	92	1.2
56	Convulsions.....	1926	263	177	440	219	157	189	1.9
		1936	107	55	162	94	51	74	1.1
		1937	83	56	139	73	52	63	0.8
106	Bronchite.....	1926	90	60	150	75	53	64	0.6
		1936	39	37	76	34	35	34	0.5
		1937	34	32	66	30	30	30	0.4
107-109	Pneumonie.....	1926	1,410	1,077	2,487	1,176	954	1,069	10.5
		1936	967	783	1,750	854	731	794	12.0
		1937	1,105	809	1,914	977	755	869	11.5
116-118	Maladies de l'estomac.....	1926	156	126	282	130	112	121	1.2
		1936	70	40	110	62	37	50	0.8
		1937	52	43	95	46	40	43	0.6

¹ Pour ces causes, la comparabilité entre les chiffres de 1926 et ceux des années 1936-37 n'est pas exacte en raison des changements dans la classification.

² Moins d'un dixième d'un pour cent.