

18.—Taux bruts et taux standardisés de mortalité au Canada, par province, 1931-38, et moyennes pour 1921-25, 1926-30 et 1931-35.

Province.	Moyennes.			1931.	1932.	1933.	1934.	1935.	1936.	1937.	1938.
	1921-25.	1926-30.	1931-35.								
Ile du Prince Edouard—											
Taux brut.....	12.5	11.0	11.3	10.4	11.8	11.6	11.6	11.0	11.1	12.3	11.0
Taux standardisé.....	9.3	8.1	7.9	7.4	8.2	8.1	8.1	7.6	7.6	8.4	7.4
Nouvelle-Ecosse—											
Taux brut.....	12.6	12.4	11.7	11.6	11.9	11.6	11.5	11.7	11.0	11.2	11.1
Taux standardisé.....	10.4	10.0	9.1	9.3	9.2	9.0	8.9	9.0	8.4	8.5	8.4
Nouveau-Brunswick—											
Taux brut.....	13.1	12.5	11.2	11.4	11.0	11.7	11.0	11.1	11.0	12.3	11.0
Taux standardisé.....	11.5	10.9	9.6	9.8	9.4	9.9	9.3	9.4	9.3	10.4	9.2
Québec—											
Taux brut.....	1	13.5	11.1	12.0	11.4	10.7	10.6	10.7	10.3	11.3	10.3
Taux standardisé.....	1	13.1	10.8	11.7	11.1	10.4	10.3	10.4	10.1	11.1	10.1
Ontario—											
Taux brut.....	11.3	11.2	10.1	10.4	10.5	9.9	9.7	9.9	10.2	10.4	9.9
Taux standardisé.....	10.3	9.8	8.5	8.9	8.8	8.5	8.3	8.1	8.3	8.4	7.9
Manitoba—											
Taux brut.....	8.6	8.3	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	8.1	8.7	8.5	8.2
Taux standardisé.....	9.4	8.8	7.6	7.9	7.8	7.6	7.0	7.8	8.4	8.1	7.6
Saskatchewan—											
Taux brut.....	7.5	7.3	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.6	6.8	7.4	6.5
Taux standardisé.....	8.5	8.2	7.1	7.5	7.4	7.0	6.7	6.9	7.1	7.7	6.6
Alberta—											
Taux brut.....	8.3	8.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.1	7.5	8.0	8.0	7.5
Taux standardisé.....	9.5	9.4	7.8	8.0	8.4	7.6	7.3	7.7	8.2	8.3	7.5
Colombie Britannique—											
Taux brut.....	8.7	9.3	8.9	8.8	8.7	8.7	8.8	9.3	9.6	10.6	9.8
Taux standardisé.....	9.0	8.9	8.0	8.1	8.0	7.8	7.8	8.1	8.2	8.9	8.1
Canada (à l'exclusion des Territoires)—											
Taux brut.....	1	11.1	9.7	10.1	9.9	9.6	9.4	9.7	9.7	10.2	9.5
Taux standardisé.....	1	10.5	9.1	9.5	9.3	8.9	8.7	9.0	9.0	9.5	8.8

¹ Avant 1926, le Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

Causes de décès.—Près de 87 p.c. des décès déclarés de 1934 à 1938 dans le territoire d'enregistrement actuel sont attribuables aux 32 causes spécifiées dans les tableaux 19 et 20. Dans ces tableaux et au graphique de la p. 128 les groupements sont en conformité avec la liste internationale telle qu'elle a été révisée en 1929 et appliquée aux statistiques canadiennes de mortalité pour la première fois en 1931. Chaque révision de la liste internationale présente des difficultés spéciales quand il s'agit de garder la continuité. Au graphique de la page 128, par exemple, il serait nécessaire de construire les courbes des maladies du cœur, des artères et du premier âge suivant les révisions de 1920 s'il fallait comparer avec les années 1926 et suivantes. D'autre part, on n'aurait pas là un vrai portrait de la plus récente révision; c'est pourquoi les graphiques sont construits pour les années de 1931 à 1937 d'après la révision de 1929.

Les changements effectués d'après cette révision: (1) maladies des artères coronaires, comprises dans les maladies des artères dans la révision de 1920, sont maintenant comprises dans les maladies du cœur; (2) l'embolie et la thrombose des artères coronaires, non comprises dans les maladies du cœur ou des artères en 1920, sont maintenant comprises dans les maladies du cœur; (3) l'athrepsie était comprise avec "diarrhée et athrepsie" dans la révision de 1920, mais ces causes de décès sont maintenant comprises avec les maladies de l'enfance.

Dans toute analyse de l'importance relative des causes de décès on doit tenir compte du fait que la population canadienne est une population qui vieillit, c'est-à-dire que la moyenne d'âge augmente d'année en année en fonction de l'influence exercée à la longue par une diminution de la natalité et de la mortalité spécifique et par une immigration très réduite depuis 1913 et dont les effets sur la répartition