

l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux, sont responsables de plus de 46 p.c. des décès d'enfants en 1938. En 1926 il était de 41.4 et en 1930 de 42.3, et comme le total des décès d'enfants a diminué de près de 38 p.c. de 1926 à 1938, il est évident que les méthodes de soins post-nataux des enfants ont fait des progrès. En 1937 et 1938, 45.1 et 50.1 p.c. respectivement de tous les nouveau-nés décédés étaient âgés de moins d'un mois et 32.5 et 37.4 p.c. respectivement étaient âgés de moins d'une semaine, comme l'indique le tableau 25.

#### 24.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes de décès, 1926, 1937-38.

NOTA.—Les chiffres de l'ancien territoire d'enregistrement, les années 1921-25, paraissent aux pp. 188-189 de l'Annuaire de 1927-28. Les chiffres de tout le Canada à partir de 1926 paraissent aux tableaux correspondants des Annaires antérieurs à partir de l'édition de 1932.

N° de la liste internationale.	Cause de décès.	Année.	Nombre.			Taux par 100,000 naissances vivantes.			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès.
			Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	Sexe masculin.	Sexe féminin.	Total.	
7	Rougeole.....	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1937	158	110	268	140	103	122	1.6
		1938	53	38	91	45	34	40	0.6
8	Scarlatine.....	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1937	6	5	11	5	5	5	0.1
		1938	8	5	13	7	4	6	0.1
9	Coqueluche.....	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1937	216	269	485	191	251	220	2.9
		1938	154	180	334	131	161	146	2.3
10	Diptérie.....	1926	24	23	47	20	20	20	0.2
		1937	10	14	24	9	13	11	0.1
		1938	15	5	20	13	4	9	0.1
11	Influenza <sup>1</sup> .....	1926	576	374	950	481	331	408	4.0
		1937	545	394	939	482	368	426	5.6
		1938	298	221	519	253	198	226	3.6
15	Erysipèle.....	1926	51	50	101	43	44	43	0.4
		1937	13	9	22	11	8	10	0.1
		1938	8	9	17	7	8	7	0.1
16	Poliomyélite et polio- encéphalite aiguës...	1926	6	3	9	5	3	4	0.3
		1937	7	2	9	6	2	4	0.1
		1938	2	2	4	2	2	2	0.1
18	Méningite cérébrospi- nale épidémique.....	1926	33	24	57	28	21	24	0.2
		1937	12	12	24	11	11	11	0.1
		1938	12	9	21	10	8	9	0.1
23-32	Tuberculose <sup>1</sup> .....	1926	131	102	233	109	90	100	1.0
		1937	85	64	149	75	60	68	0.9
		1938	85	59	144	72	53	63	1.0
34	Syphilis.....	1926	68	60	128	57	53	55	0.5
		1937	121	81	202	107	76	92	1.2
		1938	54	49	103	46	44	45	0.7
86	Convulsions.....	1926	263	177	440	219	157	189	1.9
		1937	83	56	139	73	52	63	0.8
		1938	82	58	140	70	52	61	1.0
106	Bronchite.....	1926	90	60	150	75	53	64	0.6
		1937	34	32	66	30	30	30	0.4
		1938	40	27	67	34	24	29	0.5
107-109	Pneumonie.....	1926	1,410	1,077	2,487	1,176	954	1,069	10.5
		1937	1,105	809	1,914	977	755	869	11.5
		1938	1,078	765	1,843	915	686	803	12.7
116-118	Maladies de l'estomac..	1926	156	126	282	130	112	121	1.2
		1937	52	43	95	46	40	43	0.6
		1938	37	41	78	31	37	34	0.5

<sup>1</sup>Pour ces causes, la comparabilité entre les chiffres de 1926 et ceux des années 1937 et 1938 n'est pas exacte en raison des changements dans la classification.

<sup>2</sup> Moins d'un dixième d'un pour cent.