

et en 1930, de 42.3; et, comme le total des décès d'enfants a diminué d'environ 45 p.c. de 1926 à 1940, il est évident que les méthodes de soins post-nataux des enfants ont fait des progrès. En 1939 et 1940, 50.5 et 52.6 p.c. respectivement de tous les nouveau-nés décédés étaient âgés de moins d'un mois et 37.3 et 39.2 p.c. respectivement étaient âgés de moins d'une semaine, comme l'indique le tableau 25.

24.—Mortalité infantile au Canada, par principales causes, 1926 et 1938-40

NOTA.—Les chiffres de l'ancien territoire d'enregistrement, les années 1921-25, paraissent aux pp. 188-189 de l'Annuaire de 1927-28. Les chiffres de tout le Canada à partir de 1926 paraissent aux tableaux correspondants des Annuaire antérieurs à partir de l'édition de 1932.

N° de la liste internationale	Cause de décès	Année	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes			Répartition proportionnelle parmi les causes de décès
			Sexe masculin	Sexe féminin	Total	Sexe masculin	Sexe féminin	Total	
7	Rougeole.....	1926	141	122	263	118	108	113	1.1
		1938	53	38	91	45	34	40	0.6
		1939	30	39	69	26	35	30	0.5
		1940	35	33	68	28	28	28	0.5
8	Scarlatine.....	1926	13	12	25	11	11	11	0.1
		1938	8	5	13	7	4	6	0.1
		1939	6	8	14	5	7	6	0.1
		1940	3	3	6	2	3	2	1
9	Coqueluche.....	1926	358	415	773	299	368	332	3.3
		1938	154	180	334	131	161	146	2.3
		1939	200	182	382	170	163	166	2.7
		1940	228	244	472	182	205	193	3.4
10	Diphthérie.....	1926	24	23	47	20	20	20	0.2
		1938	15	5	20	13	4	9	0.1
		1939	11	20	31	9	18	14	0.2
		1940	9	3	12	7	3	5	0.1
11	Influenza ²	1926	576	374	950	481	331	408	4.0
		1938	298	221	519	253	198	226	3.6
		1939	442	307	749	376	274	326	5.4
		1940	345	253	598	275	213	245	4.3
15	Erysipèle.....	1926	51	50	101	43	44	43	0.4
		1938	8	9	17	7	8	7	0.1
		1939	6	9	15	5	8	7	0.1
		1940	3	7	10	2	6	4	0.1
16	Poliomyélite et polio-encéphalite aiguës....	1926	6	3	9	5	3	4	0.3
		1938	2	2	4	2	2	2	1
		1939	4	2	6	3	2	3	1
		1940	1	Nil	1	1	Nil	3	1
18	Méningite cérébrospinale épidémique.....	1926	33	24	57	28	21	24	0.2
		1938	12	9	21	10	8	9	0.1
		1939	9	10	19	8	9	8	0.1
		1940	10	8	18	8	7	7	0.1
23-32	Tuberculose ²	1926	131	102	233	109	90	100	1.0
		1938	85	59	144	72	53	63	1.0
		1939	52	56	108	44	50	47	0.8
		1940	46	42	88	37	35	36	0.6
34	Syphilis.....	1926	68	60	128	57	53	55	0.5
		1938	54	49	103	46	44	45	0.7
		1939	60	26	86	51	23	37	0.6
		1940	40	36	76	32	30	31	0.6
86	Convulsions.....	1926	263	177	440	219	157	189	1.9
		1938	82	58	140	70	52	61	1.0
		1939	80	58	138	68	52	60	1.0
		1940	96	57	153	77	48	63	1.1

¹ Moins d'un dixième d'un pour cent.

² Pour cette cause la comparabilité entre les chiffres de 1926 et ceux des années 1938-40 n'est pas exacte en raison des changements dans la classification.