

Causes de décès.—Près de 89 p.c. des décès enregistrés au Canada au cours des années 1940-42 sont dus à 28 causes spécifiées dont la nomenclature se trouve au tableau 18. Dans ce tableau, les groupements concordent avec les révisions des listes internationales en 1929 et 1938. Ces révisions furent d'abord appliquées aux statistiques vitales canadiennes, pour les années 1931 et 1941 respectivement. Chaque révision de la liste internationale complique le maintien de la continuité. Les chiffres ont été ajustés pour fins de comparaison. Dans toute analyse de l'importance relative des causes de décès, les conséquences du vieillissement de la population canadienne doivent être considérées. Ces conséquences sont exposées brièvement aux pages 91-92 de l'Annuaire de 1941.

18.—Décès et mortalité par 100,000 âmes au Canada, par principales causes, 1940-42

NOTA.—Les statistiques de 1941 et 1942 ne se comparent pas entièrement à celles des années précédentes, à cause des différents modes de répartition, occasionnés par les nouvelles classifications et la nouvelle disposition des rubriques, recommandés dans la cinquième révision de la liste internationale des causes de décès.

| No de la liste internationale ¹ | Cause de décès | Décès | | | Mortalité par 100,000 âmes | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | 1940 | 1941 | 1942 | 1940 | 1941 | 1942 |
| 1, 2 | Fièvre typhoïde, y compris la paratyphoïde..... | 224 | 165 | 108 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
| 8 | Scarlatine..... | 125 | 117 | 129 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 9 | Coqueluche..... | 628 | 437 | 560 | 5.5 | 3.8 | 4.8 |
| 10 | Diphthérie..... | 213 | 240 | 256 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| 13 | Tuberculose de l'appareil respiratoire..... | 4,643 | 5,002 | 4,947 | 40.9 | 43.5 | 42.5 |
| 14-22 | Tuberculose d'autres organes..... | 1,146 | 1,070 | 1,033 | 10.1 | 9.3 | 8.9 |
| 33 | Influenza..... | 2,789 | 2,411 | 1,227 | 24.5 | 21.0 | 10.5 |
| 35 | Rougeole..... | 168 | 325 | 131 | 1.5 | 2.8 | 1.1 |
| 45-55 | Cancer et autres tumeurs malignes..... | 13,322 | 13,417 | 13,654 | 117.2 | 116.8 | 117.3 |
| 61 | Diabète sucré..... | 1,787 | 2,140 | 2,242 | 15.7 | 18.6 | 19.3 |
| 73 | Anémies..... | 616 | 408 | 354 | 5.4 | 3.6 | 3.0 |
| 83 | Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire..... | 2,296 | 9,034 | 8,728 | 20.2 | 78.6 | 75.0 |
| 86 | Convulsions (moins de 5 ans)..... | 192 | 199 | 195 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 90-95 | Maladies du cœur..... | 20,278 | 26,602 | 27,529 | 178.4 | 231.5 | 236.6 |
| 96, 97, 99, 102 | Maladies des artères..... | 11,742 | 2,266 | 2,270 | 103.3 | 19.7 | 19.5 |
| 106 | Bronchite..... | 331 | 394 | 383 | 2.9 | 3.4 | 3.3 |
| 107-109 | Pneumonie..... | 6,132 | 5,955 | 5,778 | 54.0 | 51.8 | 49.7 |
| 119, 120 | Diarrhée et entérite..... | 1,891 | 2,319 | 2,400 | 16.6 | 20.2 | 20.6 |
| 121 | Appendicite..... | 1,103 | 1,051 | 824 | 9.7 | 9.1 | 7.1 |
| 122 | Hernie, obstruction intestinale..... | 991 | 908 | 912 | 8.7 | 7.9 | 7.8 |
| 130-132 | Néphrite..... | 6,835 | 7,399 | 7,233 | 60.1 | 64.4 | 62.2 |
| 137 | Maladies de la prostate..... | 1,241 | 892 | 855 | 10.9 | 7.8 | 7.3 |
| 140-150 | Causes puerpérales..... | 978 | 901 | 818 | 8.6 | 7.8 | 7.0 |
| 157 | Vices de conformation congénitaux..... | 1,626 | 1,901 | 2,096 | 14.3 | 16.5 | 18.0 |
| 158-161 | Maladies particulières à la première année de vie..... | 6,318 | 6,252 | 6,029 | 55.6 | 54.4 | 51.8 |
| 162 | Sénilité..... | 1,555 | 1,593 | 1,650 | 13.7 | 13.9 | 14.2 |
| 163, 164 | Suicides..... | 948 | 896 | 839 | 8.3 | 7.8 | 7.2 |
| 166-198 | Morts violentes (suicides exceptés)..... | 6,470 | 7,546 | 7,332 | 56.9 | 65.7 | 63.0 |
| | Autres causes spécifiées..... | 13,705 | 11,862 | 11,493 | 120.6 | 102.4 | 98.8 |
| | Totaux, causes spécifiées..... | 110,293 | 113,601 | 112,005 | 970.5 | 988.7 | 962.5 |
| 199-200 | Causes non spécifiées ou mal définies..... | 634 | 1,038 | 978 | 5.6 | 9.0 | 8.4 |
| | Totaux, toutes causes..... | 110,927 | 114,639 | 112,973 | 976.1 | 997.8 | 970.9 |

¹ Les numéros figurant dans cette colonne sont ceux de la nomenclature internationale des causes de décès, révisée en 1938 par la Commission internationale de classification des maladies et causes de décès. Cette classification, dans sa forme détaillée, intermédiaire ou abrégée, est acceptée par presque tous les pays civilisés.

Mortalité dans les villes canadiennes et centres incorporés.—La proportion des décès, dans les villes du Canada énumérées au tableau 19, demeure assez constante, à environ 1 p.c., durant la période 1926-40. Sur la base des décès de résidents, par rapport à la population résidente, les années individuelles données indiquent une proportion de 1 p.c. de l'ensemble des décès.