

28.—Décès et mortalité d'enfants de moins d'un an (à l'exclusion des mort-nés) dans les centres urbains de 10,000 âmes et plus, selon le domicile, 1941-44, et moyennes quinquennales, 1931-40, selon le lieu de survenance—fin

Province et centre urbain	Décès d'enfants						Taux par 1,000 naissances vivantes					
	Moyenne, 1931-35	Moyenne, 1939-40	1941	1942	1943	1944	Moyenne, 1931-35	Moyenne, 1939-40	1941	1942	1943	1944
Saskatchewan—												
Moose Jaw.....	24	20	18	15	32	18	51	40	47	32	60	38
Prince Albert.....	27	28	12	18	6	23	68	55	40	53	18	63
Regina.....	61	62	32	39	57	63	48	47	29	34	46	55
Saskatoon.....	48	35	18	28	31	35	50	38	24	35	36	39
Alberta—												
Calgary.....	74	63	66	65	67	75	44	37	37	33	31	34
Edmonton.....	109	107	61	80	70	101	49	39	32	38	28	39
Lethbridge.....	34	30	15	14	17	12	64	47	57	37	43	29
Medicine Hat.....	18	14	9	10	7	21	51	40	40	40	21	63
Col. Britannique—												
New Westminster....	24	26	25	13	23	17	43	33	52	30	43	34
Vancouver.....	117	117	119	153	174	168	35	29	27	29	30	29
Victoria.....	23	27	11	34	38	36	33	31	14	33	27	26

Mortalité infantile par cause.—Au Canada, environ 90 p.c. de la mortalité infantile est attribuable aux neuf causes et groupes de causes inscrits au tableau 29. La naissance prématurée, à elle seule, contribue pour plus de 20 p.c. à la mortalité infantile. Les garçons sont beaucoup plus sujets que les filles à presque toutes les causes de décès énumérées ici.

29.—Mortalité infantile et taux par 100,000 naissances vivantes, par principales causes, 1941-44, et moyennes quinquennales, 1931-40

NOTA.—Les chiffres de 1944 sont donnés selon le domicile.

No de la liste internationale	Cause de décès et année	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes			Répartition proportionnelle par cause de décès p.c.
		Sexe masc.	Sexe féminin	Total	Sexe masc.	Sexe féminin	Total	
	Maladies transmissibles ¹							
	Moy., 1931-35	916	780	1,696	782	701	743	9.9
	Moy., 1936-40	859	698	1,557	731	627	681	10.6
	1941	857	697	1,554	653	561	609	10.2
	1942	611	541	1,152	435	411	423	7.9
	1943	672	628	1,300	461	456	458	8.5
	1944	582	581	1,163	397	422	409	7.5
86	Convulsions.....							
	Moy., 1931-35	132	86	218	113	77	95	1.3
	Moy., 1936-40	90	57	147	77	51	64	1.0
	1941	80	62	142	61	50	56	0.9
	1942	87	62	149	62	47	55	1.0
	1943	94	54	148	65	39	52	1.0
	1944	62	39	101	42	28	36	0.6
106-109	Bronchite et pneumonie.....							
	Moy., 1931-35	1,121	852	1,973	957	766	864	11.5
	Moy., 1936-40	1,080	810	1,890	920	728	826	12.9
	1941	1,274	966	2,240	971	778	877	14.7
	1942	1,220	895	2,115	868	679	777	14.4
	1943	1,240	908	2,148	851	659	757	14.1
	1944	1,158	933	2,091	790	678	736	13.5
119	Diarrhée et entérite ²							
	Moy., 1931-35	1,631	1,171	2,802	1,392	1,053	1,227	16.4
	Moy., 1936-40	1,047	767	1,814	892	689	793	12.3
	1941	998	695	1,693	761	560	663	11.1
	1942	1,006	745	1,751	716	566	643	12.0
	1943	827	596	1,423	568	432	502	9.4
	1944	1,190	967	2,157	811	703	759	13.9

Renvois à la fin du tableau, p. 172.