

**28.—Décès et mortalité d'enfants de moins d'un an (à l'exclusion des mort-nés) dans les centres urbains de 10,000 et plus, 1941-1945—fin**

Province et centre urbain	Décès d'enfants					Taux par 1,000 naissances vivantes				
	1941	1942	1943	1944	1945	1941	1942	1943	1944	1945
<b>Ontario—fin</b>										
Oshawa.....	20	25	15	18	19	38	41	24	3	32
Ottawa.....	167	145	157	147	134	54	44	47	42	37
Owen-Sound.....	17	15	20	26	18	54	47	60	80	64
Pembroke.....	22	19	11	23	30	77	62	37	76	99
Peterborough.....	22	35	24	31	32	39	48	36	45	42
Port-Arthur.....	28	17	16	19	17	53	29	23	35	30
St. Catharines.....	16	21	21	23	25	26	29	27	29	33
St. Thomas.....	20	18	18	13	15	58	45	43	34	41
Sarnia.....	14	14	22	18	21	37	35	45	39	41
Sault-Ste-Marie.....	27	36	28	31	28	41	48	37	43	38
Stratford.....	11	11	14	15	9	39	39	46	48	34
Sudbury.....	61	54	92	98	64	46	40	65	76	52
Timmins.....	42	23	41	36	38	43	29	53	53	51
Toronto.....	343	401	482	411	373	36	34	41	36	33
Welland.....	14	14	19	16	21	52	36	44	43	65
Windsor.....	71	109	118	101	89	32	44	46	42	40
Woodstock.....	14	5	11	10	10	62	16	36	42	38
<b>Manitoba—</b>										
Brandon.....	13	18	13	16	20	48	54	30	41	56
Saint-Boniface.....	12	16	23	20	18	32	41	64	42	40
Winnipeg.....	148	172	190	140	138	41	43	43	36	32
<b>Saskatchewan—</b>										
Moose-Jaw.....	18	15	32	18	18	47	32	60	38	40
Prince-Albert.....	12	18	6	23	37	40	53	13	63	101
Regina.....	32	39	57	63	51	29	34	46	55	42
Saskatoon.....	18	28	31	35	32	24	35	36	39	35
<b>Alberta—</b>										
Calgary.....	66	65	67	75	90	37	33	31	34	40
Edmonton.....	61	80	70	101	95	32	38	28	39	34
Lethbridge.....	15	14	17	12	19	57	37	48	29	45
Medicine-Hat.....	9	10	7	21	17	40	40	21	63	57
<b>Colombie-Britannique—</b>										
New-Westminster.....	25	13	23	17	18	52	30	43	34	36
Vancouver.....	119	153	174	168	171	27	29	30	29	30
Victoria.....	11	34	38	36	26	14	33	27	26	23

**Mortalité infantile par cause.**—Au Canada, environ 90 p. 100 de la mortalité infantile est attribuable aux neuf causes et groupes de causes inscrits au tableau 29. La naissance prématurée, à elle seule, contribue plus de 20 p. 100 à la mortalité infantile. Le taux de presque toutes les causes est plus élevé chez les garçons; les maladies transmissibles en 1944 sont la seule exception donnée dans le tableau.

**29.—Décès d'enfants et mortalité infantile par 100,000 naissances vivantes, par principales causes, 1941-1945**

NOTA.—Les chiffres de 1944 et 1945 sont donnés selon le domicile; ceux des années précédentes, selon le lieu de survenance.

N° de la liste internationale	Cause de décès et année	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes			Répartition proportionnelle par cause de décès
		Garçons	Filles	Total	Garçons	Filles	Total	
	Maladies transmissibles <sup>1</sup> .....							%
	1941	857	697	1,554	653	561	609	10.2
	1942	611	541	1,152	435	411	422	7.9
	1943	672	628	1,309	461	456	458	8.5
	1944	582	581	1,163	397	422	408	7.5
	1945	548	492	1,040	368	352	360	7.0

<sup>1</sup> Y compris rougeole, scarlatine, coqueluche, diphtérie, influenza, érysipèle, poliomyélite et polioencéphalite aiguës, méningite cérébrospinale, tuberculose et syphilis.