24.—Décès et mortalité par 100,000 âmes au Canada, par principales causes, 1944-1946

NOTA.—Les chiffres sont donnés selon le domicile.

N° de la liste internationale[1]	Cause de décès	Nombre de décès			Mortalité par 100,000 âmes		
		1944	1945	1946	1944	1945	1946
1, 2	Fièvre typhoïde, y compris la paratyphoïde	131	101	91	1·1	0·8	0·7
8	Scarlatine	115	79	58	1·0	0·7	0·5
9	Coqueluche	337	470	231	2·8	3·9	1·9
10	Diphtérie	309	271	227	2·6	2·2	1·8
13	Tuberculose de l'appareil respiratoire	4,705	4,565	4,818	39·3	37·7	39·2
14-22	Tuberculose d'autres organes	1,019	981	1,003	8·5	8·1	8·2
33	Influenza	1,864	1,087	1,601	15·6	9·0	13·0
35	Rougeole	239	97	235	2·0	0·8	1·9
45-55	Cancer et autres tumeurs malignes	14,271	14,439	14,767	119·3	119·3	120·2
61	Diabète sucré	2,362	2,417	2,409	19·8	20·0	19·6
73	Anémies	355	355	311	3·0	2·9	2·5
83	Lésions intracraniennes d'origine vasculaire	9,089	9,421	9,486	76·0	77·8	77·2
86	Convulsions (moins de 5 ans)	155	134	119	1·3	1·1	1·0
90-95	Maladies du cœur	29,148	29,705	29,854	243·8	245·5	243·1
96, 97 99, 102	Maladies des artères	2,349	2,210	2,230	19·6	18·3	18·2
106	Bronchite	431	394	378	3·6	3·3	3·1
107-109	Pneumonie	5,940	5,549	5,657	49·7	45·9	46·1
119, 120	Diarrhée et entérite	2,695	2,019	1,873	22·5	16·7	15·2
121	Appendicite	809	677	551	6·8	5·6	4·5
122	Hernie, obstruction intestinale	911	863	854	7·6	7·1	7·0
130-132	Néphrite	7,124	6,926	6,822	59·6	57·2	55·5
137	Maladies de la prostate	951	847	820	8·0	7·0	6·7
140-150	Causes puerpérales	776	660	595	6·5	5·5	4·8
157	Vices de conformation congénitaux	2,004	2,134	2,338	16·8	17·6	19·0
158-161	Maladies particulières à la première année de vie	6,655	6,394	7,053	55·7	52·8	57·4
162	Sénilité	1,690	1,624	1,584	14·1	13·4	12·9
163, 164	Suicides	731	764	1,002	6·1	6·3	8·2
166-198	Morts violentes (suicides exceptés)	6,957	7,047	7,195	58·2	58·2	58·6
	Autres causes spécifiées	11,121	10,305	9,995	93·0	85·2	81·4
	Totaux, causes spécifiées	**115,243**	**112,535**	**114,157**	**963·7**	**929·9**	**929·4**
199-200	Causes non spécifiées ou mal définies	809	879	774	6·8	7·3	6·3
	Totaux, toutes causes	**116,052**	**113,414**	**114,931**	**970·5**	**937·2**	**935·7**

[1] Les numéros sont ceux de la liste internationale des causes de décès, revisée en 1938 par la Commission internationale de classification des maladies et causes de décès. Cette classification, dans sa forme détaillée, intermédiaire ou abrégée, est acceptée par presque tous les pays civilisés.

Sous-section 2.—Mortalité infantile

L'énergie déployée ces dernières années pour réduire la mortalité infantile a obtenu de bons résultats dans plusieurs pays. Au Canada, les services d'hygiène fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que les organismes privés de bienfaisance ont tous participé à cet effort. Aussi les chiffres de 1926 à 1946 montrent-ils une amélioration frappante. Ainsi, sur tous les enfants nés en 1942-1946, environ 60,000 ont vécu jusqu'à leur premier anniversaire qui seraient morts d'après le taux de mortalité de 1926-1930.

La mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles. Il a déjà été mentionné qu'il naît de 1,057 à 1,067 garçons pour 1,000 filles. La mortalité infantile étant plus forte chez les garçons, l'excédent de garçons est beaucoup moindre à la fin de la première année. Ainsi, en 1940-1942, il est né 397,038 garçons contre 374,908 filles, excédent de 22,130 ou de 5·9 p. 100; il est mort 25,024 garçons durant la première année contre 18,646 filles, soit 6,378 de plus. L'excédent des garçons à un an est donc de 15,752 ou 4·4 p. 100. D'après la table de survie, p. 202, le nombre d'hommes devient égal à celui des femmes à l'âge de 52 ans.