

maintenant moins de 2 par 1,000 naissances. Les deux dernières colonnes du tableau indiquent que la mortalité est beaucoup plus élevée chez les mères non mariées que chez les mères mariées.

29.—Mortalité puerpérale et taux par 1,000 naissances vivantes, par province, 1944-1946

NOTA.—Chiffres selon le domicile.

Détail	Mortalité puerpérale										Mortalité puerpérale des mères non mariées	
	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Canada ¹	Nom-bre	% du total
Totaux—												
1944	12	33	43	318	198	49	42	31	50	776	48	6.19
1945	6	24	25	256	171	31	49	48	50	660	38	5.76
1946	6	28	34	229	160	32	36	32	38	595	39	6.55
Taux par 1,000 naissances vivantes—												
1944	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6	2.7	4.0	
1945	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6	2.3	2.9	
1946	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.8	2.9	

¹ Moins les Territoires.

Âge des mères mortes en couches.—Le tableau 30 donne la répartition de la mortalité puerpérale selon l'âge des mères ainsi que l'âge moyen au décès. Cet âge moyen dépasse d'un peu plus de deux ans celui de toutes les mères à l'époque de la naissance de leurs enfants. Les taux par 1,000 naissances vivantes, par groupe d'âge, indiquent clairement que l'âge est un facteur décisif de l'incidence de la mortalité puerpérale. Bien que les proportions de tous les groupes d'âge aient fort diminué, les inégalités entre les groupes d'âge subsistent. Le taux du groupe de 30-34 ans est actuellement près de deux fois aussi élevé que celui du groupe de 20-24 ans; au-dessus de 40 ans, il est plus de quatre fois aussi élevé. Le taux un peu plus haut du premier groupe d'âge indiqué dans le tableau 30, comparativement au deuxième, s'explique par la proportion beaucoup plus forte d'enfants illégitimes nés de jeunes mères.

30.—Mortalité puerpérale et taux par 1,000 naissances vivantes, par groupe d'âge, 1945 et 1946, et moyennes triennales, 1930-1932 et 1940-1942

NOTA.—Les chiffres de 1945 et 1946 sont donnés selon le domicile.

Groupe d'âge	Mortalité puerpérale								Taux par 1,000 naissances vivantes			
	Moyenne, 1930-1932		Moyenne, 1940-1942		1945		1946		Moyenne, 1930-1932	Moyenne, 1940-1942	1945	1946
	nomb.	%	nomb.	%	nomb.	%	nomb.	%				
Moins de 20 ans.....	76	6.0	47	5.2	28	4.2	27	4.5	5.03	2.80	1.65	1.39
20-24 ans.....	216	17.0	151	16.8	110	16.7	90	15.1	3.56	2.13	1.40	0.97
25-29 ".....	271	21.4	212	23.6	161	24.4	142	23.9	4.16	2.77	1.95	1.46
30-34 ".....	278	21.9	206	22.9	136	20.6	130	21.8	5.66	4.03	2.21	1.90
35-39 ".....	263	20.8	180	20.0	135	20.5	121	20.3	7.80	6.14	3.79	3.17
40-44 ".....	140	11.0	91	10.1	81	12.3	72	12.1	10.56	8.72	6.98	5.91
45-49 ".....	23	1.8	11	1.2	8	1.2	13	2.2	16.73	10.00	7.14	10.99
50 ans et plus.....	néant	—	1	0.1	1	0.2	néant	—	—	1	1	—
Totaux, âges déclarés.	1,267	100.0	899	100.0	660	100.0	595	100.0	—	—	—	—
Totaux, tous âges.	1,267	—	899	—	660	—	595	—	5.28	3.51	2.29	1.80
Âge moyen.....	31.3		31.1		31.5		31.7		—	—	—	—

¹ Les cas dans ce groupe d'âge ne sont pas assez nombreux pour motiver le calcul d'un taux.