

23.—Décès, selon le sexe et par groupes d'âge, 1946 et 1947

Groupes d'âge	Hommes				Femmes			
	1946		1947		1946		1947	
	nomb.	%	nomb.	%	nomb.	%	nomb.	%
Moins de 1 an.....	8,824	13·8	9,430	14·2	6,610	13·0	6,906	13·5
1 an.....	724	1·1	654	1·0	610	1·2	548	1·1
2 ans.....	375	0·6	347	0·5	269	0·5	266	0·5
3 ".....	276	0·4	245	0·4	237	0·5	192	0·4
4 ".....	235	0·4	208	0·3	174	0·3	151	0·3
Totaux, moins de 5 ans.....	10,434	16·3	10,884	16·4	7,900	15·6	8,063	15·7
5-9 ans.....	738	1·2	703	1·1	559	1·1	465	0·9
10-14 ".....	576	0·9	523	0·8	406	0·8	359	0·7
15-19 ".....	895	1·4	574	1·3	691	1·4	675	1·3
20-24 ".....	1,217	1·8	1,075	1·6	964	1·9	881	1·7
25-29 ".....	1,034	1·6	1,078	1·6	952	1·9	869	1·7
30-34 ".....	1,059	1·7	1,033	1·6	1,006	2·0	945	1·8
35-39 ".....	1,265	2·0	1,339	2·0	1,108	2·2	1,048	2·0
40-44 ".....	1,689	2·6	1,687	2·5	1,265	2·5	1,210	2·4
45-49 ".....	2,221	3·5	2,435	3·7	1,703	3·4	1,605	3·1
50-54 ".....	3,095	4·8	3,194	4·8	2,153	4·2	2,119	4·1
55-59 ".....	4,441	6·9	4,550	6·8	2,904	5·7	2,778	5·4
60-64 ".....	5,814	9·1	6,021	9·1	3,537	7·0	3,747	7·3
65-69 ".....	6,877	10·7	7,118	10·7	4,579	9·0	4,658	9·1
70-74 ".....	6,880	10·7	7,269	10·9	5,331	10·5	5,506	10·7
75-79 ".....	6,627	10·3	6,776	10·2	5,569	11·0	5,740	11·2
80-89 ".....	8,082	12·6	8,453	12·7	8,449	16·6	8,761	17·1
90 ans et plus.....	1,251	1·9	1,342	2·0	1,678	3·3	1,824	3·6
Totaux, âges déclarés.....	64,105	100·0	66,401	100·0	59,754	100·0	51,253	100·0
Âges non déclarés.....	54	--	34	--	18	--	13	--
Totaux, tous âges.....	64,159	100·0	66,435	100·0	59,772	100·0	51,266	100·0

Causes de décès.—Environ 91 p. 100 des décès au Canada sont dus aux 28 causes mentionnées au tableau 24. Environ 80 p. 100 sont dus aux 10 causes principales: maladies du cœur, cancer, lésions intracrâniennes, mort violente, néphrite, maladies du bas âge, pneumonie, tuberculose, influenza et maladies des artères.

Le classement des causes de décès est fait selon la *Nomenclature internationale*, révisée en 1938 et utilisée pour la première fois au Canada en 1941. Chaque révision rend difficile la continuité du classement, surtout pour les maladies du cœur, les lésions intracrâniennes (hémorragie cérébrale) et les maladies des artères.

La montée de l'âge moyen au décès est signalée à la p. 224. Les décès dus aux maladies qui frappent surtout les enfants et les jeunes adultes ont diminué. La diphtérie, par exemple, a presque disparu. La tuberculose a aussi fort reculé. Par ailleurs, le vieillissement de la population augmente la proportion des décès dus aux causes qui frappent surtout le vieil âge. Ainsi, le cancer, la néphrite et les maladies du cœur causent maintenant une proportion sensiblement plus forte des décès.