

La montée de l'âge moyen au décès est signalée à la p. 187. Les décès dus aux maladies qui frappent surtout les enfants et les jeunes adultes ont diminué. La diphtérie, par exemple, a presque disparu et la tuberculose a fort reculé. Par ailleurs, le vieillissement de la population augmente la proportion des décès dus aux maladies qui frappent surtout le vieil âge. Ainsi, le cancer, la néphrite et les maladies du cœur causent maintenant une proportion sensiblement plus forte des décès.

26.—Décès et mortalité par 100,000 habitants au Canada, par principales causes, 1946-1948

(Sauf les territoires)

N° de la nomenclature internationale ¹	Cause de décès	Nombre de décès			Mortalité par 100,000 habitants		
		1946	1947	1948	1946	1947	1948
1, 2	Fièvre typhoïde, y compris la paratyphoïde.....	91	62	52	0.7	0.5	0.4
8	Scarlatine.....	58	42	38	0.5	0.3	0.3
9	Coqueluche.....	231	232	155	1.9	1.8	1.2
10	Diphtérie.....	227	140	86	1.8	1.1	0.7
13	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	4,818	4,616	4,016	39.2	36.8	31.2
14-22	Tuberculose d'autres organes.....	1,003	833	757	8.2	6.6	5.9
33	Grippe (influenza).....	1,601	1,099	911	13.0	8.8	7.1
35	Rougeole.....	235	134	235	1.9	1.1	1.8
45-55	Cancer et autres tumeurs malignes.....	14,767	15,615	16,258	120.2	124.3	126.4
61	Diabète sucré.....	2,409	2,484	2,607	19.6	19.8	20.3
73	Anémies.....	311	321	316	2.5	2.6	2.5
83	Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire.....	9,486	9,583	10,177	77.2	76.3	79.1
86	Convulsions (enfants de moins de 5 ans).....	119	107	91	1.0	0.9	0.7
90-95	Maladies du cœur.....	29,854	32,050	33,901	243.1	255.2	263.6
96, 97	Maladies des artères.....	2,230	2,374	2,349	18.2	18.9	18.3
99, 102	Bronchite.....	378	363	402	3.1	2.9	3.1
106	Pneumonie.....	5,657	5,688	5,700	46.1	45.3	44.3
107-109	Diarrhée et entérite.....	1,873	1,988	1,799	15.2	15.8	14.0
119, 120	Appendicite.....	551	470	482	4.5	3.7	3.7
121	Hernie, obstruction intestinale.....	854	864	865	7.0	6.9	6.7
122	Néphrite.....	6,822	6,568	6,805	55.5	52.3	52.9
130-132	Maladies de la prostate.....	820	841	796	6.7	6.7	6.2
137	Causes puerpérales.....	595	554	510	4.8	4.4	4.0
140-150	Vices de conformation congénitaux.....	2,338	2,483	2,327	19.0	19.8	18.1
158-161	Maladies particulières à la première année de vie.....	7,053	7,415	7,045	57.4	59.0	54.8
162	Sénilité.....	1,584	1,489	1,320	12.9	11.9	10.3
163, 164	Suicide.....	1,002	948	1,000	8.2	7.5	7.8
166-198	Morts violentes (suicide excepté).....	7,195	7,666	7,958	58.6	61.0	61.9
	Autres causes spécifiées.....	9,995	9,890	9,783	81.4	78.8	76.1
	Total, causes spécifiées.....	114,157	116,919	118,741	929.4	931.0	923.4
199, 200	Causes non spécifiées ou mal définies.....	774	806	643	6.3	6.4	5.0
	Total, toutes causes.....	114,931	117,725	119,384	935.7	937.5	928.4

¹ Revision de 1938 (5^e) de la Nomenclature internationale des causes de décès

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Comparaisons internationales.—La Nouvelle-Zélande a déclaré pendant plusieurs années la mortalité infantile la moins élevée. En 1948, le taux y est de 22 par 1,000 naissances vivantes, contre 68 en 1905, 51 en 1920 et 34 en 1930. L'Islande a également un taux de 22 par 1,000 en 1947. En Angleterre et au pays de Galles, le taux baisse de 128 par 1,000 en 1905 à 60 en 1930 et 34 en 1948. Aux