

limite de la région des Grands lacs et du Saint-Laurent, longe ensuite les pâturages des provinces des Prairies, pour finir aux contreforts des Rocheuses et, vers le nord-ouest, dans le Territoire du Yukon. Elle est bornée au nord par la limite des terres boisées. Les principaux arbres de la région sont l'épinette blanche et l'épinette noire, le peuplier faux-tremble, le sapin baumier, le peuplier, le tamarac, le bouleau blanc et le pin gris.

Cette région se divise en deux sections très distinctes: la section septentrionale et la section des bosquets de peupliers. La section septentrionale s'étend entre les forêts ayant une valeur commerciale, au sud, et la toundra arctique, au nord. L'épinette blanche et l'épinette noire, le tamarac et le bouleau blanc, dont la pousse est rabougrie, en sont les essences caractéristiques. La section des bosquets de peupliers, zone de transition entre la région forestière proprement dite, au nord, et les prairies sans arbres, au sud, contient surtout des peupliers. On y rencontre, toutefois, des chênes à gros fruits, des ormes blancs et des frênes verts dans certains endroits.

**Région des Grands lacs et du Saint-Laurent.**—Cette région s'étend au sud des forêts boréales dans la partie est du Canada. Occupant la région sud-ouest de Terre-Neuve, elle s'étend, vers l'ouest, du bassin hydrographique des Grands lacs et de la vallée du Saint-Laurent jusqu'à la région sud-est du Manitoba. Quelques-uns des premiers centres de colonisation se trouvent dans cette région et, à bien des endroits, la forêt a été considérablement décimée; on n'y trouve maintenant que des lots à bois et des parcelles boisées sur des terres pauvres. La région se caractérise surtout par le pin blanc et le merisier. On y trouve aussi un grand nombre d'essences, comme le pin résineux, le pin gris, l'épinette blanche, l'épinette noire, le sapin baumier, le cèdre, la pruche, le bouleau blanc, l'érable et l'orme.

**Région acadienne.**—Cette région englobe l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et tout le Nouveau-Brunswick, sauf l'angle nord-ouest. Elle se caractérise par la prédominance de l'épinette rouge, conifère généralement mêlé de sapin baumier, d'épinette blanche, d'épinette noire, de pruche, de merisier et d'érable à sucre.

**Région décidue.**—Cette région consiste, au Canada, en une petite intrusion septentrionale de la grande forêt du même genre qui se trouve, en climat tempéré, aux États-Unis. Elle occupe la péninsule Sarnia-Niagara, dans le sud d'Ontario. Ses essences caractéristiques sont le hêtre et l'érable à sucre, mêlés de tilleul d'Amérique, d'érable rouge et de plusieurs variétés de chêne. Plusieurs essences à grandes feuilles, comme le caryer, le noyer noir d'Amérique, le tulipier, le magnolia à feuilles acuminées, le mûrier, le sycomore, le sassafras et nombre d'autres espèces ont dans cette région leur limite septentrionale.

**Région sub-alpine.**—Il s'agit d'une forêt se composant essentiellement de conifères qui occupe les versants supérieurs des Cordillères, à l'est de la chaîne côtière, et s'étendant entre la toundra alpine et la région montane. En général, cette forêt occupe des étendues hautes de 3,500 à 6,000 pieds. Les essences principales sont l'épinette d'Engelman, le sapin concolore, le pin de Murray et le peuplier faux-tremble.

**Région colombienne.**—Les forêts de la région, appelées souvent zone humide de l'intérieur de la Colombie-Britannique, se composent de futaies qui croissent dans les vallées du Columbia et du Fraser, à des altitudes variant de 2,500 à 4,000