

Mortalité infantile dans les centres urbains.—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 193-195), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

Causes de décès chez les enfants.—Sur les 15,303 décès d'enfants survenus en 1952, près de 15 p. 100 sont attribuables à des malformations congénitales, 14 p. 100 à la débilité, plus de 10 p. 100 à la pneumonie chez les enfants âgés de plus de quatre semaines et à des lésions obstétricales, et environ 8 p. 100 à l'asphyxie et à l'atélectasie postnatales. Ces causes déterminées provoquent 57 p. 100 des décès d'enfants. Le graphique "Principales causes des décès d'enfants" donne l'importance relative des principales causes de décès chez les enfants, et le graphique "Décès d'enfants par âge" donne les chiffres comparatifs de la mortalité infantile pour chaque mois. Le tableau 19 donne les décès d'enfants par cause et province, et le tableau 20 donne les chiffres comparatifs pour chaque cause durant les années 1950-1952.

