

20.—Décès d'enfants et taux par 100,000 naissances vivantes, par cause, 1950-1952
(Sans les territoires)

No de la liste internationale	Causes de décès	Nombre de décès			Taux par 100,000 naissances vivantes		
		1950	1951	1952	1950	1951	1952
001-019	Tuberculose.....	73	67	41	20	18	10
020-029	Syphilis.....	18	9	7	5	2	2
045-048	Dysenterie.....	40	27	24	11	7	6
050	Scarlatine.....	2	2	2	1	1	2
052	Erysipèle.....	—	4	—	—	—	—
055	Diphthérie.....	4	—	1	1	—	1
056	Coqueluche.....	236	139	104	64	37	26
057	Infections à méningocoques.....	38	33	40	10	9	10
085	Rougeole.....	60	70	73	16	18	18
140-239	Tumeurs.....	42	41	47	11	11	12
273	Maladies du thymus.....	98	79	65	26	21	16
340	Méningite (non méningococcique).....	164	132	145	44	35	36
391, 392	Otite moyenne.....	238	201	251	64	53	62
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	78	65	73	21	17	18
480-483	Grippe.....	301	440	316	81	116	79
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,701	1,527	1,604	458	402	398
500-502	Bronchite.....	108	121	102	29	32	25
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	107	103	107	29	27	27
571	Gastro-entérite et colite.....	858	802	877	231	211	218
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	5	4	3	1	1	1
750-759	Malformations congénitales.....	1,856	2,063	2,226	500	543	553
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,587	1,461	1,532	428	384	381
762	Asphyxie et atelectasie postnatales.....	*1,076	1,160	1,314	290	305	326
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	456	423	483	123	111	120
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	232	185	214	63	49	53
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	51	51	56	14	13	14
769	Toxémie prénatale.....	112	175	171	57	46	42
770	Érythroblastose.....	299	336	366	81	88	91
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	103	105	130	28	28	32
772	Déséquilibre alimentaire.....	177	517	161	48	41	40
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	1,210	1,059	1,125	326	279	279
774-776	Débilité.....	2,279	2,117	2,164	614	557	538
795	Causes mal définies ou inconnues.....	367	274	275	99	72	68
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	11	12	19	3	3	5
E900-E904	Chutes accidentelles.....	21	12	10	6	3	2
E916	Accidents causés par le feu.....	29	28	30	8	7	7
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	221	223	325	60	59	58
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	136	132	131	37	35	33
	Autres morts accidentelles et violentes.....	60	54	64	16	14	16
	Autres causes déterminées.....	770	691	715	208	182	178
	Total, toutes causes.....	15,324	14,584	15,303	4,130	3,537	3,802

* Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes enceintes et en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 191-193. Bien que le nombre de naissances ait beaucoup augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale n'a cessé de diminuer depuis environ 1930 (soit 1,215 décès et un taux de presque cinq par 1,000 naissances vivantes) pour tomber à 349 en 1952. Depuis 1945, la mortalité puerpérale est tombée au-dessous de deux par 1,000 naissances vivantes et, en 1952, elle était inférieure à une par 1,000 naissances vivantes. La mortalité est plus élevée chez les mères non mariées que chez les mères mariées.

Âge au décès.—Le tableau 21 répartit la mortalité puerpérale par groupe d'âge et selon l'âge moyen des mères au décès, lequel dépasse d'un peu plus de deux ans l'âge moyen de toutes les mères au moment de l'accouchement. Les taux par 1,000 naissances vivantes et par groupe d'âge indiquent que l'âge est un facteur décisif de la mortalité puerpérale. Les taux de tous les groupes d'âge ont fort diminué, mais les inégalités entre les groupes subsistent (voir graphique "Mortalité