

## 2.—Cas signalés de certaines maladies à déclarer et taux par 100,000 habitants, 1926-1953

Année	Diphtérie	Poliomy-élite (toutes formes)	Variolo	Tuberculose (toutes formes)	Fièvre typhoïde et paratyphoïde
Moyenne, 1926-1930	8,301	661	2,189	5,743	3,270
Moyenne, 1931-1935	3,294	637	273	8,287	2,410
Moyenne, 1936-1940	2,777	1,202	90	9,322	1,760
Moyenne, 1941-1945	2,917	800	9	12,926	1,195
1946	2,535	2,527	2	15,263	921
1947	1,550	2,291	—	13,739	697
1948	898	1,168	—	12,363	565
1949	806	2,458	—	13,097	761
1950	421	911	—	12,429	718
1951	253	2,568	—	11,152	559
1952	190	4,755	—	10,506	509
1953	132	8,878	—	10,572	457
TAUX PAR 100,000 HABITANTS <sup>1</sup>					
Moyenne, 1926-1930	84.5	6.7	22.3	58.5	33.3
Moyenne, 1931-1935	31.1	6.5	2.6	78.1	22.7
Moyenne, 1936-1940	24.9	10.8	0.8	83.7	15.8
Moyenne, 1941-1945	24.9	6.8	0.1	109.7	10.1
1946	20.7	20.6	2	124.4	7.5
1947	12.4	18.3	—	109.7	5.6
1948	7.0	9.1	—	96.6	4.4
1949	6.0	18.3	—	97.6	5.7
1950	3.1	6.7	—	90.8	5.2
1951	1.8	18.4	—	79.7	4.0
1952	1.3	33.0	—	72.9	3.5
1953	0.9	60.2	—	71.6	3.1

<sup>1</sup> D'après les estimations officielles de la population (voir p. 140).

<sup>2</sup> Moins de 0.1 par 100,000 habitants.

## 3.—Cas déclarés de certaines maladies à déclarer et taux par 100,000 habitants (population estimative), par province, 1953

N° de la liste int.	Maladie	T.-N.	Î.-P.-E.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Total
056	Coqueluche	10	70	1,370	29	3,920	1,570	212	390	1,100	716	9,387
055	Diphtérie	3	1	6	3	70	8	4	5	24	8	132
045-048	Dysenterie <sup>1</sup>	—	19	—	—	133	176	28	51	46	589	1,042
046	amibienne	—	2	—	—	14	10	—	3	2	1	32
045	bacillaire	—	17	—	—	119	166	28	48	44	588	1,010
082	Encéphalite infectieuse	—	—	6	—	—	10	12	12	2	4	46
044	Fièvre ondulante <sup>2</sup>	—	1	—	4	89	19	12	2	2	5	134
480-483	Influenza épidémique <sup>1</sup>	12	2,935	4,934	42	—	859	259	48	213	808	10,110
020-039	Maladies vénériennes	497	38	620	218	4,821	3,174	1,350	1,481	2,723	3,285	18,207
020-029	Syphilis	91	14	136	53	1,272	738	87	117	153	257	2,898
030-035	Blennorrhagie	406	24	481	165	3,549	2,432	1,261	1,363	2,570	3,039	15,290
036-039	Autres <sup>2</sup>	—	—	3	—	—	4	2	—	1	9	19
057-0	Méningite méningococcique	14	—	10	16	39	97	36	40	7	42	301
089	Oreillons	112	202	2,426	323	6,166	14,778	1,042	1,514	1,665	8,069	36,297
080	Poliomyélite épidémique	233	11	31	88	488	2,239	2,317	1,202	1,472	797	8,878
085	Rougeole	322	337	2,543	49	8,984	22,237	2,845	5,586	7,327	7,641	57,871
086	Rubéole <sup>2</sup>	5	—	336	119	648	2,624	45	714	4,159	1,095	9,745
050	Scarlatine	538	3697	61	473	3,592	3,448	494	903	1,956	2,220	14,054
087	Varielle	162	266	1,918	58	9,657	20,872	1,507	2,816	3,333	6,869	47,458
084	Variolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
001-019	Tuberculose	467	63	151 <sup>3</sup>	628 <sup>3</sup>	4,094	1,412	878	576 <sup>3</sup>	795	1,508	10,572
001, 002	pulmonaire	450	58	137	619	3,957	10	871	406	719	1,350	8,547
003-019	non pulmonaire	17	25	11	6	137	10	7	130	76	158	567
040, 041	Typhoïde et paratyphoïde	17	—	2	31	294	51	—	11	18	33	457

Renvois à la fin du tableau, p. 255.