

Mortalité infantile dans les centres urbains.—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 206-207), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

Causes de décès chez les enfants.—Les décès d'enfants ont été de 14,764 en 1953 et de 13,841 en 1954. En 1954, 2,137 sont attribuables à des malformations congénitales, 2,062 à la débilité, 1,577 à la pneumonie chez les enfants âgés de plus de quatre semaines, 1,507 à l'asphyxie et à l'atélectasie postnatales, 1,386 à des lésions obstétricales, soit plus de 62 p. 100 du total. Le graphique ci-contre donne l'importance relative des principales causes de décès chez les enfants de 1931 à 1954 et le graphique ci-dessous donne les chiffres comparatifs de la mortalité infantile pour chaque mois de la première année de vie. Le tableau 15 donne les décès d'enfants, par cause, pour les années 1952-1954.

DÉCÈS D'ENFANTS PAR ÂGE

1954

TAUX POUR 100,000
NAISSANCES VIVANTES

LÉGENDE

1930-1932 1940-1942
1954

1930-1932 1940-1942 - 1954

1 ^{er} MOIS	4,028	2,944	1,927 [†]
3 PREMIERS MOIS	5,516	3,967	2,437
4 À 12 MOIS	2,733	1,690	744
1 ^{re} ANNÉE	8,249	5,657	3,181

MOINS DE
28 JOURS
MOINS DE
3 SEMAINES
MOINS DE
2 SEMAINES
MOINS DE
1 SEMAINE

MOINS DE
1 JOUR1^{er}
MOIS

† MOINS DE 28 JOURS

2^e 3^e 4^e 5^e 6^e 7^e 8^e 9^e 10^e 11^e 12^e