

## 15.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1952-1954

(Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest)

N° de la liste internationale	Causes de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1952	1953	1954	1952	1953	1954
001-019	Tuberculose.....	41	55	42	10	13	10
020-029	Syphilis.....	7	2	6	2	1	1
045-048	Dysenterie.....	24	20	12	6	5	3
050	Scarlatine.....	2	3	2	1	1	1
052	Erysipèle.....	—	4	1	—	1	1
055	Diphthérie.....	1	—	1	1	—	1
056	Coqueluche.....	104	97	75	26	23	17
057	Infections à méningocoques.....	40	46	50	10	11	11
085	Rougeole.....	73	43	56	18	10	13
140-239	Tumeurs.....	47	40	35	12	10	8
273	Maladies du thymus.....	65	53	37	16	13	9
325	Déficience mentale.....	17	37	24	4	9	6
340	Méningite (non méningococcique).....	145	142	138	36	34	32
391, 392	Otite moyenne.....	251	201	200	62	48	46
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	73	77	77	18	18	18
480-483	Grippe.....	316	348	172	79	83	40
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,604	1,571	1,577	398	377	362
500-502	Bronchite.....	102	115	123	25	28	28
543	Gastrite et duodénite.....	11	10	5	3	2	1
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	107	98	86	27	24	20
571	Gastro-entérite et colite.....	877	762	542	218	183	125
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	3	2	7	1	1	2
750-759	Malformations congénitales.....	2,226	2,161	2,137	553	518	491
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,532	1,420	1,386	381	341	319
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,314	1,316	1,507	326	316	346
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	483	516	438	120	124	101
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	214	211	137	53	51	31
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	56	47	51	14	11	12
769	Toxémie prénatale.....	171	181	146	42	43	34
770	Érythroblastose.....	366	339	365	91	81	84
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	130	149	146	32	36	31
772	Déséquilibre alimentaire.....	161	130	112	40	31	26
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	1,125	939	777	279	223	179
774-776	Débilité.....	2,164	2,243	2,062	538	538	474
795	Causes mal définies ou inconnues.....	275	230	192	68	55	44
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	19	14	12	5	3	3
E900-E904	Chutes accidentelles.....	10	11	14	2	3	3
E916	Accidents causés par le feu.....	30	30	25	7	7	6
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	235	215	248	58	52	57
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	131	156	128	33	33	29
	Autres morts accidentelles et violentes.....	64	62	56	16	15	13
	Autres causes déterminées.....	687	697	644	171	167	148
	<b>Total, toutes causes.....</b>	<b>15,303</b>	<b>14,764</b>	<b>13,841</b>	<b>3,802</b>	<b>3,542</b>	<b>3,181</b>

<sup>1</sup> Moins de 1 pour 100,000 naissances vivantes.

## Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes enceintes et en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 000-000. Bien que le nombre de naissances ait beaucoup augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale n'a cessé de diminuer depuis environ 1930 (soit 1,215 décès et un taux de presque cinq par 1,000 naissances vivantes) pour tomber à 290 en 1954. Depuis 1945, la mortalité puerpérale est tombée au-dessous de deux par 1,000 naissances vivantes et, en 1954, elle était inférieure à une par 1,000 naissances vivantes. La mortalité est plus élevée chez les mères non mariées que chez les mères mariées.

Âge au décès.—Le tableau 16 répartit la mortalité puerpérale par groupe d'âge et selon l'âge moyen des mères au décès, lequel dépasse d'un peu plus de deux ans l'âge moyen de toutes les mères au moment de l'accouchement. Les taux par 1,000 naissances vivantes et par groupe d'âge indiquent que l'âge est un facteur décisif de la mortalité puerpérale. Les taux de tous les groupes d'âge ont fort diminué, mais les inégalités entre les groupes