

Le taux des admissions de tuberculeux et de non-tuberculeux, qui était de 85.8 pour 100,000 âmes en 1938, a atteint 113.0 en 1946, puis a diminué à 104.6 en 1954 (voir le tableau 5). Le taux de 1954 est le plus bas depuis 1945; mais il est de 21.9 p. 100 supérieur à celui de 1938.

Le taux relatif aux admissions de tuberculeux seulement a augmenté plus modérément pendant la période de 1938 à 1954, soit de 77.2 à 89.4 par 100,000 âmes. Le taux de 1954 est le plus bas enregistré depuis 1944 et représente la cinquième diminution annuelle consécutive. Les admissions de non-tuberculeux ont enregistré en 1942 leur taux le plus bas, soit 6.8 par 100,000 âmes; mais ce taux atteint en 1954 le point record de 15.2. Les 2,312 malades d'après lesquels le taux de 1954 est établi représentent près de 14.5 p. 100 de toutes les admissions aux institutions pour tuberculeux, cette année-là, soit la plus forte proportion jamais enregistrée (voir le tableau 5).

Étudiés séparément, les taux des premières admissions et des réadmissions de tuberculeux pour 100,000 âmes révèlent des points de ressemblance importants (voir graphique, p. 260). Le taux des premières admissions s'est élevé de 57.5 en 1938 à 77.2 en 1946, pour diminuer ensuite quelque peu irrégulièrement à un bas de 62.7 en 1954, le moins élevé depuis 1939 et de 9 p. 100 supérieur à celui de 1938. De même, le taux des réadmissions est parti d'un bas de 19.5 en 1938 pour toucher le sommet sans précédent de 32.8 en 1950 et fléchir brusquement à 27.7 en 1954. Il n'en représente pas moins une augmentation de 37 p. 100 depuis 1938. Si l'on tient compte de l'augmentation (36 p. 100) de la population durant cette période, l'importance de ces taux fléchissants devient évidente.

5.—Admissions, cas de tuberculose signalés et décès (1937-1954)

(Taux pour 100,000 habitants)

Année	Tuberculeux admis pour la première fois		Tuberculeux réadmis		Total des tuberculeux admis		Non-tuberculeux admis		Toutes admissions	
	nombre	taux	nombre	taux	nombre	taux	nombre	taux	nombre	taux
1938	6,429	57.5	2,166	19.5	8,595	77.2	964	8.7	9,559	85.8
1939	6,859	61.0	2,325	20.7	9,184	81.6	1,028	8.1	10,212	90.8
1940	7,444	65.5	2,517	22.1	9,961	87.7	912	8.0	10,873	95.7
1941	7,754	67.5	2,547	22.2	10,301	89.7	868	7.6	11,169	97.2
1942	7,816	67.2	2,392	20.6	10,208	87.7	796	6.8	11,004	94.6
1943	7,943	67.4	2,447	20.8	10,390	88.2	900	7.6	11,290	95.9
1944	7,878	66.0	2,553	21.4	10,431	87.4	874	7.3	11,305	94.8
1945	8,403	69.7	2,685	22.3	11,088	92.0	1,023	8.5	12,111	100.5
1946	9,476	77.2	3,264	26.6	12,740	103.8	1,117	9.1	13,857	113.0
1947	8,753	69.9	3,504	28.0	12,257	97.8	888	7.1	13,145	104.9
1948	8,663	67.7	4,139	32.3	12,802	100.0	970	7.6	13,772	107.6
1949	9,340	71.4	4,146	31.7	13,486	103.1	932	7.1	14,418	110.2
1950	9,440	69.0	4,484	32.8	13,924	101.7	1,126	8.2	15,050	110.0
1951	9,257	66.2	4,415	31.6	13,672	97.8	1,227	8.8	14,899	106.5
1952	9,580	66.4	4,224	29.3	13,804	95.7	1,456	10.1	15,260	105.8
1953	9,661	65.4	4,197	28.4	13,858	93.8	1,661	11.2	15,519	105.1
1954	9,523	62.7	4,056	26.7	13,579	89.4	2,312	15.2	15,891	104.6

INCIDENCE ET MORTALITÉ

La diminution du taux des cas de tuberculose signalés a été assez lente: il avait atteint, en 1944, un sommet de 128.2 pour 100,000 âmes; en 1954, il était tombé à 69.1 (voir graphique et tableau 6, p. 262). Cette lente diminution, ajoutée au taux croissant des non-tuberculeux admis aux institutions pour tuberculeux, a eu pour effet de retarder la diminution du taux de toutes les admissions.

Au cours de la période qui s'est écoulée de 1937 à 1954, le taux de mortalité par tuberculose a diminué d'une façon phénoménale: en 1954, il était de 10.3 pour 100,000 âmes, au regard de 60.4 en 1937 (voir graphique et tableau 6, p. 262). De 1945 à 1954, il a baissé de 71.8 p. 100. On a observé une tendance parallèle dans le nombre des décès de tuberculeux survenus dans les institutions pour tuberculeux: la diminution a été de 62.4 p. 100 durant la même période. Exprimé à un taux par millier de malades hospitalisés le 31 décembre, les décès de tuberculeux dans les institutions pour tuberculeux ont diminué radicalement de 227.5 en 1943 à 53.0 en 1954.