

8.—Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire et taux pour 100,000 habitants, 1926-1955

Année	Diphthérie	Poliomyélite (toutes formes)	Variole	Tuberculose (toutes formes)	Fièvres typhoïde et paratyphoïde
Moyenne de 1926-1930.....	8,301	661	2,189	5,743	3,270
Moyenne de 1931-1935.....	3,294	687	273	8,287	2,410
Moyenne de 1936-1940.....	2,777	1,202	90	9,322	1,760
Moyenne de 1941-1945.....	2,927	800	9	12,926	1,195
Moyenne de 1946-1950.....	1,242	1,871	—	13,378	732
1946.....	2,535	2,527	2	15,263	921
1947.....	1,550	2,291	—	13,739	697
1948.....	898	1,168	—	12,363	565
1949.....	806	2,458	—	13,097	761
1950.....	421	911	—	12,429	718
1951.....	253	2,568	—	11,152	559
1952.....	190	4,755	—	10,506	509
1953.....	132	8,878	—	10,572	457
1954.....	208	2,390	—	10,474	469
1955.....	139	1,020	—	10,177	380
TAUX POUR 100,000 HABITANTS ¹					
Moyenne de 1926-1930.....	84.5	6.7	22.3	58.5	33.3
Moyenne de 1931-1935.....	31.1	6.5	2.6	78.1	22.7
Moyenne de 1936-1940.....	24.9	10.8	0.8	83.7	15.8
Moyenne de 1941-1945.....	24.9	6.8	0.1	109.7	10.1
Moyenne de 1946-1950.....	9.8	14.6	—	103.8	5.7
1946.....	20.7	20.6	2	124.4	7.5
1947.....	12.4	18.3	—	109.7	5.6
1948.....	7.0	9.1	—	96.6	4.4
1949.....	6.0	18.3	—	97.6	5.7
1950.....	3.1	6.7	—	90.8	5.2
1951.....	1.8	18.4	—	79.7	4.0
1952.....	1.3	33.0	—	72.9	3.5
1953.....	0.9	60.2	—	71.6	3.1
1954.....	1.4	15.8	—	69.1	3.1
1955.....	0.9	6.5	—	65.4	2.4

¹ D'après les estimations officielles de la population.² Moins de 0.1 pour 100,000 habitants.