

Mortalité infantile dans les centres urbains.—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 202-203), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

Causes de décès chez les enfants.—Les décès d'enfants ont été de 14,399 en 1956, et 2,310 sont attribuables à des malformations congénitales, 2,224 à la débilité, 1,600 à la pneumonie chez les enfants âgés de plus de quatre semaines, 1,642 à l'asphyxie et à l'atélectasie postnatales, 1,548 à des lésions obstétricales, soit presque 65 p. 100 du total. Le graphique de la page 220 donne l'importance relative des principales causes de décès chez les enfants de 1931 à 1956 et le graphique de la page 217 donne les chiffres comparatifs de la mortalité infantile pour chaque mois de la première année de vie.

16.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1954-1956

N° de la liste internationale	Causes de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1954 ¹	1955 ¹	1956	1954 ¹	1955 ¹	1956
001-019	Tuberculose.....	42	21	18	10	5	4
020-029	Syphilis.....	6	5	6	1	1	1
045-048	Dysenterie.....	12	11	22	3	2	5
050	Scarlatine.....	2	1	1	2	2	2
052	Érysipèle.....	1	1	1	2	2	2
055	Diphtérie.....	1	1	—	2	2	—
056	Coqueluche.....	75	107	93	17	24	21
057	Infections à méningocoques.....	50	42	38	11	10	8
085	Rougeole.....	56	66	72	13	15	16
140-239	Tumeurs.....	35	40	41	8	9	9
273	Maladies du thymus.....	37	38	33	9	9	7
325	Déficience mentale.....	24	17	44	6	4	10
340	Méningite (non méningococcique).....	138	142	140	32	32	31
391, 392	Otite moyenne.....	200	151	122	46	34	27
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	77	66	67	18	15	15
480-483	Grippe.....	172	210	168	40	48	37
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,577	1,567	1,600	362	355	355
500-502	Bronchite.....	123	100	152	28	23	34
543	Gastrite et duodénite.....	5	5	3	1	1	1
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	86	92	135	20	21	30
571	Gastro-entérite et colite.....	542	490	484	125	111	107
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	7	3	4	2	1	1
750-759	Malformations congénitales.....	2,137	2,165	2,310	491	490	512
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,386	1,426	1,548	319	323	343
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,507	1,594	1,642	346	361	364
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	438	481	512	101	109	114
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	137	134	149	31	30	33
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	51	41	52	12	9	12
769	Toxémie prénatale.....	146	170	137	34	38	30
770	Erythroblastose.....	365	343	334	84	78	74
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	136	117	109	31	26	24
772	Déséquilibre alimentaire.....	112	107	93	26	24	21
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	777	703	748	179	159	166
774-776	Débilité.....	2,062	1,979	2,224	474	448	493
795	Causes mal définies ou inconnues.....	192	238	215	44	54	48
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	12	12	19	3	3	4
E900-E904	Chutes accidentelles.....	14	17	15	3	4	3
E916	Accidents causés par le feu.....	25	36	27	6	8	6
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	248	249	237	57	56	53
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	128	116	156	29	26	35
	Autres morts accidentelles et violentes.....	56	71	49	13	16	11
	Autres causes déterminées.....	644	592	579	148	134	128
	Total, toutes causes.....	13,841	13,767	14,399	3,183	3,116	3,193

¹ Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

² Moins de 1 pour 100,000 naissances vivantes.