

Causes de la mortalité puerpérale.—Le tableau 17 donne les principales causes de mortalité puerpérale en 1955-1957. Il y a une dizaine d'années, la septicémie puerpérale et les toxémies de la grossesse étaient de loin les causes les plus importantes. Le danger de décès par la septicémie puerpérale et autres infections a fort diminué depuis quinze à vingt années grâce aux antibiotiques et probablement aussi aux soins médicaux plus généralisés. La toxémie demeure, cependant, la principale complication mortelle de la grossesse et ne le cède qu'aux complications accompagnant l'accouchement. L'hémorragie, durant la grossesse ou l'accouchement, autre cause importante de mortalité chez les mères, a aussi perdu du terrain depuis quelques années.

17.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1955-1957

N° de la liste internationale	Causes de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1955 ¹	1956	1957	1955 ¹	1956	1957
	Complications de la grossesse	139	80	71	31	18	15
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	—	1	1	—	2	2
642	Toxémies gravidiques.....	93	53	42	21	12	9
643	Placenta prævia remarquée avant l'accouchement.....	4	—	1	1	—	2
644	Autres hémorragies gravidiques.....	8	4	1	2	1	2
645	Grossesse ectopique.....	11	10	13	2	2	3
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	23	12	13	5	3	3
	Avortement	28	25	39	6	6	8
650, 652	Avortement sans mention d'infection.....	13	11	19	3	2	4
651	Avortement avec infection.....	15	14	20	3	3	4
	Complications de l'accouchement	111	132	109	25	29	23
660	Accouchement sans complication.....	4	7	—	1	2	—
670	Accouchement, compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.....	20	26	30	5	6	6
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	8	8	5	2	2	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	32	29	16	7	6	3
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.....	7	9	7	2	2	1
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	5	11	9	1	2	2
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.....	15	21	13	3	5	3
678	Accouchement avec d'autres complications.....	20	21	29	5	5	6
	Complications des suites des couches	57	41	36	13	9	8
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	8	9	8	2	2	2
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.....	29	19	12	7	4	3
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.....	8	5	10	2	1	2
687-689	Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.....	12	8	6	3	2	1
	Total, toutes causes puerpérales	335	278	255	76	62	54

¹ Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

² Moins de 1 pour 100,000 naissances vivantes.

Section 4.—Accroissement naturel*

Le taux d'accroissement naturel au Canada (excédent des naissances sur les décès) avant 1930 était de 13 ou plus pour 1,000 habitants. A cause en partie de la crise économique, la natalité a baissé plus que la mortalité et le taux d'accroissement naturel est tombé à 9.7 en 1937. Le taux plus élevé des naissances durant et après la seconde guerre mondiale et le taux des décès de plus en plus faible ont fait constamment augmenter le taux d'accroissement naturel de 10.9 en 1939 au sommet de 20.3 en 1954. Le taux a légèrement baissé en 1955 et en 1956 (19.8), mais l'augmentation du taux des naissances et l'immobilité du taux des décès l'ont porté à 20.1 en 1957.

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 234-235.