

Parmi les malades inscrits dans les institutions pour tuberculeux, à la fin de 1958, la fréquence maximum chez les hommes (1,001) se présente dans le groupe d'âges 50-59 ans et, chez les femmes (789), dans le groupe d'âges 20-29 ans. Il y a plus d'hommes que de femmes dans chaque groupe d'âge, sauf dans celui de 10 à 29 ans. En comparaison de 1,001 hommes, à peine 338 femmes de 50 à 59 ans sont inscrites aux contrôles des institutions pour tuberculeux le 31 décembre 1958; par contre, la fréquence maximum chez les femmes de 20 à 29 ans (789) se rapproche beaucoup du nombre d'hommes malades (784).

### 6.—Diagnostics des malades inscrits des hôpitaux pour tuberculeux répondants, par catégorie et suivant l'âge et le sexe, 1958

NOTE.—Les chiffres comprennent les malades de 82 hôpitaux pour tuberculeux ainsi que les malades des quartiers pour tuberculeux des hôpitaux généraux.

Diagnostic	0-9		10-19		20-29		30-39	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	447	429	387	506	737	730	782	680
Avec mention de maladie professionnelle du poumon.....	—	—	—	—	1	1	—	—
Pulmonaire minime.....	65	55	112	163	149	189	145	169
Pulmonaire modérément avancée.....	33	28	106	147	348	314	325	273
Pulmonaire très avancée.....	12	8	58	76	195	189	281	210
Pulmonaire autre et non précisée.....	22	27	5	14	5	2	7	8
Pleurésie avec ou sans épanchement.....	12	12	42	39	56	26	24	17
Infection primaire.....	287	285	61	62	3	5	—	1
Autre.....	16	14	3	5	—	4	—	2
Tuberculose, autres formes.....	58	57	59	53	47	59	58	47
	40-49		50-59		60+		Total <sup>1</sup>	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	834	459	972	317	1,372	470	5,655	3,660
Avec mention de maladie professionnelle du poumon.....	—	1	3	—	9	—	14	3
Pulmonaire minime.....	104	97	116	52	131	70	844	315
Pulmonaire modérément avancée.....	335	192	379	127	598	196	2,172	1,299
Pulmonaire très avancée.....	569	159	460	128	610	191	2,028	976
Pulmonaire autre et non précisée.....	5	2	4	1	7	2	55	53
Pleurésie avec ou sans épanchement.....	21	7	9	6	15	9	161	116
Infection primaire.....	—	—	—	—	—	—	558	361
Autre.....	—	1	1	3	2	2	23	38
Tuberculose, autres formes.....	40	31	29	21	32	20	331	294

<sup>1</sup> Comprend les groupes d'âges inconnus.

**Installations.**—Le tableau 7 indique les installations particulières aux hôpitaux publics et fédéraux par province. A l'échelon national, plus de 75 p. 100 de ces hôpitaux sont pourvus d'appareils de radiologie, de laboratoires de clinique et de dispensaires, mais moins de 50 p. 100 sont équipés pour la physiothérapie. Au nombre des autres facteurs, le genre de service offert par l'hôpital détermine dans une certaine mesure les installations qui s'y trouvent. Ainsi, environ 84 p. 100 des hôpitaux généraux déclarent un service de radiologie, un laboratoire de clinique et un dispensaire, et près de la moitié disposent d'appareils de physiothérapie. D'autre part, à peine plus d'une sur trois des institutions pour maladies mentales étaient pourvues d'un laboratoire de clinique, d'un service de physiothérapie et d'un dispensaire, bien qu'environ deux sur trois aient eu un service de radiologie. Parmi les institutions pour tuberculeux, un peu plus de trois sur quatre possédaient un service de radiologie, environ 85 p. 100 un laboratoire de clinique, et à peine une sur trois étaient équipées pour la physiothérapie et pourvues d'un dispensaire. Moins d'un tiers des "autres" hôpitaux avaient un service de radiologie, un laboratoire de clinique et un dispensaire; à peine plus d'un tiers possédaient un service de physiothérapie.