

Sur les 215 décès puerpéraux en 1960, 69 ont été causés par des complications de la grossesse et plus de la moitié de ces derniers par des toxémies gravidiques; 83 sont dus à des complications de l'accouchement, 39 aux complications des suites des couches et 24 à l'avortement.

18.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1958-1960

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1958	1959	1960	1958	1959	1960
	Complications de la grossesse	93	82	69	20	17	14
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	1	2	1	--	--	--
642	Toxémies gravidiques.....	59	42	36	13	9	8
643	Placenta prævia remarqué avant l'accouchement.....	3	1	3	1	--	1
644	Autres hémorragies gravidiques.....	2	4	3	--	1	1
645	Grossesse ectopique.....	6	9	7	1	2	1
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	22	24	19	5	5	4
	Avortement	34	41	24	7	9	5
650, 652	Avortement sans mention d'infection.....	11	17	6	2	4	1
651	Avortement avec infection.....	23	24	18	5	5	4
	Complications de l'accouchement	96	95	83	20	20	17
660	Accouchement sans complication.....	--	1	1	--	--	--
670	Accouchement, compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.....	29	25	14	6	5	3
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	6	6	4	1	1	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post partum.....	24	24	20	5	5	4
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.....	3	7	5	1	1	1
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	6	6	6	1	1	1
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.....	15	14	18	3	3	4
678	Accouchement avec d'autres complications.....	13	12	15	3	3	3
	Complications des suites des couches	40	45	39	9	9	8
680	Infection urinaire post-partum sans autre infection.....	1	--	--	--	--	--
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	8	11	8	2	2	2
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.....	15	19	15	3	4	3
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.....	7	5	5	1	1	1
687-689	Complications des suites des couches, autres ou sans précisions.....	9	10	11	2	2	2
	Total, toutes causes puerpérales	263	263	215	56	55	45

Section 4.—Accroissement naturel*

Le taux d'accroissement naturel au Canada (excédent des naissances sur les décès) avant 1930 était de 13 ou plus pour 1,000 habitants. A cause en partie de la crise économique, la natalité a baissé plus que la mortalité et le taux d'accroissement naturel est tombé à 9.7 en 1937. Le taux plus élevé des naissances durant et après la Seconde Guerre mondiale et le taux des décès de plus en plus faible ont fait constamment augmenter le taux d'accroissement naturel de 10.9 en 1939 au sommet de 20.3 en 1954. Le taux a légèrement baissé depuis mais il est à 19.1 en 1960, le plus élevé probablement des pays les plus industrialisés du monde.

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 224-225.