

semble du Canada, il y a eu 16.4 cas pour 100,000 habitants, soit le taux le plus élevé encore. Les dysenteries, près de trois fois aussi nombreuses que la moyenne des années 1955-1959, sont survenues au rythme de 18.4 pour 100,000 en 1960 au regard de 8.1 en 1959.

Il y a eu baisse de la courbe cyclique de la fièvre scarlatine et de l'angine à streptocoques au cours de 1960. Toutefois, bien que le nombre de cas soit tombé à 21,362 contre 23,413 en 1959, la tendance n'a pas été la même dans toutes les provinces et la fréquence plus élevée en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan a contrebalancé dans une certaine mesure la diminution intervenue dans les autres provinces. D'autres maladies très en recul en 1960 sont: la tuberculose (y compris la pulmonaire), qui diminue régulièrement depuis 1949; la coqueluche, qui est descendue au taux sans précédent de 33.8 pour 100,000; la poliomyélite paralytique, dont il y a eu 909 cas contre 1,886 en 1959; et les infections méningococciques.

L'incidence des maladies vénériennes au Canada demeure assez constante depuis 1951 malgré le traitement par les antibiotiques introduit depuis la guerre. Il est possible que les vigoureuses campagnes de dépistage empêchent en partie le nombre de baisser. En 1960, le nombre de cas a augmenté de 759 sur les 16,978 de 1959. La blennorragie a dépassé la moyenne de 14,826 de 1949-1959, mais la maladie plus grave qu'est la syphilis a accusé une incidence moindre.

Le tableau 15 indique les cas de certaines maladies à déclaration obligatoire qui ont été signalés en 1960 ainsi que les totaux pour 1959.

15.—Cas de certaines maladies à déclaration obligatoire et taux pour 100,000 habitants, par province, 1960, et totaux de 1959

N <sup>o</sup> s de la nomencl. internat.	Maladie	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Canada <sup>1</sup>	
		1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959
NOMBRE DE CAS													
044	Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	—	—	78	28	31	2	2	3	142	120
764	Diarrhée épidémique du nouveau-né.....	—	—	—	—	—	2	22	2	6	24	52	92
055	Diptérie.....	—	—	2	—	15	2	15	7	12	—	53	38
045, 046, 048	Dysenteries.....	1	67	108	4	548	507	138	55	356	1,495	3,279	1,416
046	amibienne.....	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
045	bacillaire.....	1	67	1	3	548	507	131	55	153	1,174	2,640	1,238
082.0	Encéphalite infectieuse.....	—	..	—	—	—	2	3	6	2	—	9	15
049.0, 042.1, 049.2	Intoxications alimentaires..	8	2	64	7	295	2	42	17	66	715	1,216	821
092, N998.5	Hépatite infectieuse (hépatite sérique comprise).....	446	113	1,386	79	343	1,244	555	704	690	912	6,476	4,728
080.2, 082.1	Méningite à virus ou aseptique.....	20	—	1	14	281	2	34	11	73	255	690	896
057	Infections méningococciques	8	6	8	9	33	57	9	9	3	16	158	201
766	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).....	—	2	—	—	—	2	—	3	—	4	7	5
056	Coqueluche.....	252	42	115	22	2,148	1,531	217	143	580	961	6,014	7,259
080.0, 080.1	Poliomyélite paralytique..	49	1	9	92	284	39	13	56	201	165	909	1,886
050, 051	Scarlatine et angine à streptocoques.....	244	1,379	2,206	172	3,450	4,569	320	2,715	4,131	2,175	21,362	23,413
001-019	Tuberculose <sup>2</sup> .....	424	41	234	435	2,663	789	280	294	513	659	6,345	6,579
001, 002	pulmonaire.....	353	35	184	402	2,575	..	220	216	417	538	4,949	5,176
040, 041	Typhoïde et paratyphoïde.	16	1	5	2	223	42	4	2	15	25	335	544
020-039	Maladies vénériennes <sup>3</sup> .....	356	11	509	326	3,143	3,233	1,940	1,470	2,746	3,789	17,737	16,978
030-035	Blennorragie.....	329	7	469	311	2,455	2,537	1,892	1,383	2,660	3,552	15,688	14,826
020-029	Syphilis.....	26	4	40	15	688	694	48	87	188	235	2,044	2,144