

Sous-section 2.—Volume de la production agricole

L'indice du volume physique de la production agricole est estimé à 156.2 pour 1960 (1935-1939 = 100), soit 7.6 p. 100 au-dessus de celui de 145.1 en 1959 et 5 p. 100 supérieur à la moyenne quinquennale (1955-1959) de 148.8; le chiffre record (169.5) a été touché en 1956. La production de bestiaux a baissé en 1960, mais le recul a été plus que compensé par la production accrue de céréales, pommes de terre, tabac et produits de l'érable. La production de produits laitiers et avicoles n'a presque pas changé.

La production a varié de moins de 1 p. 100 dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse en 1960; elle a augmenté de 2 à 3 p. 100 au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique et d'un peu plus de 6 p. 100 en Ontario. La production de la Saskatchewan a augmenté de près de 30 p. 100, soit l'avance la plus importante de toutes les provinces, mais elle a baissé, en Alberta et au Manitoba, d'environ 4 p. 100 et 5 p. 100.

10.—Indice du volume physique de la production agricole, par province, 1951-1960

(1935-1939=100. Sans Terre-Neuve)

NOTA.—L'explication de l'indice, de ses méthodes de calcul et de sa portée a paru dans le *Bulletin trimestriel de la statistique agricole* (n° de catalogue 21-003) d'avril-juin 1952, du B.F.S. Les chiffres de 1935-1944 figurent à la p. 443 de l'*Annuaire* de 1950; et ceux de 1945-1950, dans l'*Annuaire* de 1956, p. 434.

Année	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Total
1951.....	119.5	87.7	110.4	139.0	128.6	146.4	218.1	157.1	126.9	154.7
1952.....	142.3	80.6	109.4	124.7	119.6	164.6	267.4	174.8	133.3	166.2
1953.....	142.8	80.6	121.6	132.9	129.5	131.3	237.5	158.6	136.3	157.9
1954.....	150.3	88.7	114.1	129.8	129.1	102.1	108.8	119.4	131.4	119.7
1955.....	150.0	93.3	135.9	143.8	129.6	127.3	210.8	141.2	131.2	150.4
1956.....	139.6	94.5	127.5	138.4	137.5	171.5	251.4	168.7	127.8	169.5
1957.....	161.8	93.6	126.7	132.9	142.7	126.1	141.1	118.8	143.7	133.9
1958.....	154.7	88.6	118.2	139.0	158.5	159.7	144.5	132.4	145.1	145.3
1959.....	138.5	94.3	114.4	138.5	145.9	153.1	156.4	140.5	146.9	145.1
1960.....	138.8	93.5	117.0	142.4	154.9	144.9	202.0	134.5	150.0	156.2

Sous-section 3.—Grandes cultures

Les conditions de croissance des grandes cultures partout au Canada ont varié sensiblement suivant les régions en 1961. Dans les Prairies, elles n'ont été que satisfaisantes ou maigres, étant même désastreuses dans maints endroits; par contre, dans l'Est, elles ont été bonnes ou excellentes et un certain nombre de cultures en Ontario ont même donné un rendement l'acre sans précédent. Les Prairies ont reçu suffisamment de pluie pour produire des récoltes égales à la moyenne décennale de 1951-1960, mais les pluies ont été légères durant les mois d'automne. Le temps généralement frais ainsi que la pluie et la neige du printemps de 1961 ont assuré assez d'humidité à la germination des cultures, mais la sécheresse et la chaleur excessive ont sévi tôt en juin et persisté sans guère de répit durant juillet et août. En général, les conditions