

15.—Décès et mortalité pour 100,000 habitants, selon la Liste abrégée internationale de 50 causes, 1960 et 1961 (fin)

N° de la Liste internationale		Cause de décès	Décès		Taux pour 100,000 habitants	
Liste abrégée	Liste détaillée		1960	1961	1960 ¹	1961
B26	420-422	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.....	42, 439	43, 233	237.5	237.0
B27	430-434	Autres maladies du cœur.....	2, 129	2, 095	11.9	11.5
B28	440-443	Hypertension avec maladie du cœur.....	3, 222	3, 179	18.0	17.4
B29	444-447	Hypertension, sans mention du cœur.....	985	907	5.5	5.0
B30	480-483	Grippe.....	547	537	3.1	2.9
B31	490-493	Pneumonie.....	5, 360	5, 072	30.0	27.8
B32	500-502	Bronchite.....	862	839	4.8	4.6
B33	540, 541	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	921	846	5.2	4.6
B34	550-553	Appendicite.....	187	167	1.0	0.9
B35	560, 561, 570	Occlusion intestinale et hernie.....	890	929	5.0	5.1
B36	543, 571, 572	Gastrite, duodénite, gastro-entérite et colite, sauf la diarrhée chez le nouveau-né.....	974	907	5.5	5.0
B37	581	Cirrhose du foie.....	1, 097	1, 083	6.1	5.9
B38	590-594	Néphrite et néphrose.....	1, 558	1, 481	8.7	8.1
B39	610	Hypertrophie de la prostate.....	485	510	5.4 ²	5.5 ²
B40	640-652, 660, 670-689	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.....	215	219	44.9 ³	46.0 ³
B41	750-759	Malformations congénitales.....	2, 696	2, 822	15.1	15.5
B42	760-762	Lésions obstétricales, asphyxie et atelectasie postnatales.....	2, 787	2, 766	15.6	15.2
B43	763-768	Infections de nouveau-né.....	582	539	3.3	3.0
B44	769-776	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité non spécifiée.....	3, 716	3, 854	20.8	21.1
B45	780-795	Sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues.....	1, 357	1, 220	7.6	6.7
B46	Reliquat	Toutes autres maladies.....	11, 040	11, 445	61.8	62.8
BE47	E810-E-835	Accidents d'automobiles.....	3, 700	3, 882	20.7	21.3
BE48	E800-E-802 E840-E-962	Tous autres accidents.....	5, 703	5, 758	31.9	31.6
BE49	E963, E-970 E979	Suicide.....	1, 350	1, 366	7.6	7.5
BE50	E964, E965 E980-E999	Homicide et faits de guerre.....	253	223	1.4	1.2
Total, toutes causes.....			139,693	140,985	781.7	773.0

¹ Plusieurs taux ont été revisés depuis la publication de l'Annuaire de 1962; voir le nota du tableau 1. ² Pour 100,000 hommes. ³ Pour 100,000 naissances vivantes.

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Le tableau 1, pp. 227-228, et le tableau 16 laissent voir la diminution marquée de la mortalité infantile ces vingt dernières années. Bien que 68,307 des 2,372,737 enfants nés au cours de la période quinquennale 1957-1961 n'aient pas vécu un an, 154,730 qui seraient morts au taux de 1926-1930 ont survécu. Cette amélioration tient à plusieurs facteurs: proportion accrue d'enfants naissant à l'hôpital ou bénéficiant de soins pré- et postnataux; meilleure surveillance des approvisionnements d'eau; meilleures conditions sanitaires; pasteurisation du lait; usage des antibiotiques; progrès des services de pédiatrie, d'obstétrique et des soins hospitaliers; amélioration du milieu familial grâce à l'élévation du niveau de vie et, ces dernières années, l'âge plus jeune des mères.

Les variations de la mortalité infantile d'une province à l'autre et d'une localité à l'autre tiennent à la mesure dans laquelle ces facteurs peuvent jouer dans chaque province ou localité.

Le tableau 16 montre que la mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles au Canada; les différences sont encore plus grandes entre les provinces. Dans l'ensemble du pays, sur chaque millier de garçons nés vivants en 1961, 30 n'ont pas vécu un an, contre 24 filles par millier. Comme il est dit plus haut, il naît en moyenne 1,057 garçons pour 1,000 filles; cependant, comme la mortalité chez les garçons est plus élevée, l'excédent des garçons est très réduit vers la fin de la première année.