

Causes de la mortalité puerpérale.—Le tableau 19 donne les principales causes de mortalité puerpérale en 1959–1961. Il y a une dizaine d'années, la septicémie puerpérale et les toxémies de la grossesse étaient de loin les causes les plus importantes. Le danger de décès par la septicémie puerpérale et autres infections a fort diminué depuis 15 à 20 ans grâce aux antibiotiques et probablement aussi aux soins médicaux plus généralisés. D'autre part, le nombre de décès dus à la toxémie gravidique et autres complications de la grossesse et de l'accouchement présentent sans cesse les mêmes problèmes. L'hémorragie durant la grossesse ou l'accouchement, autre cause importante de décès chez les mères, perd du terrain depuis quelques années.

Sur les 219 décès puerpéraux en 1961, 53 ont été causés par des complications de la grossesse et plus de la moitié de ces derniers par des toxémies gravidiques; 96 sont dus à des complications de l'accouchement, 44 aux complications des suites des couches et 26 à l'avortement.

19.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1959-1961

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1959	1960	1961	1959	1960	1961
	Complications de la grossesse	82	69	53	17	14	11
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	2	1	1	--	--	--
642	Toxémies gravidiques.....	42	36	29	9	8	6
643	Placenta prævia remarqué avant l'accouchement.....	1	3	--	--	1	--
644	Autres hémorragies gravidiques.....	4	3	3	1	1	1
645	Grossesse ectopique.....	9	7	5	2	1	1
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	24	19	15	5	4	3
	Avortement	41	24	26	9	5	5
650, 652	Avortement sans mention d'infection.....	17	6	10	4	1	2
651	Avortement avec infection.....	24	18	16	5	4	3
	Complications de l'accouchement	95	83	96	20	17	20
660	Accouchement sans complication.....	1	1	--	--	--	--
670	Accouchement, compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.....	25	14	18	5	3	4
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	6	4	3	1	1	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	24	20	20	5	4	4
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.....	7	5	8	1	1	2
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	6	6	3	1	1	1
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.....	14	18	27	3	4	6
678	Accouchement avec d'autres complications.....	12	15	17	3	3	4
	Complications des suites des couches	45	39	44	9	8	9
680	Infection urinaire post-partum sans autre infection.....	--	--	--	--	--	--
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	11	8	13	2	2	3
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.....	19	15	13	4	3	3
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.....	5	5	3	1	1	1
687-689	Complications des suites des couches, autres ou sans précisions.....	10	11	15	2	2	3
	Total, toutes causes puerpérales	263	215	219	55	45	46

Section 4.—Accroissement naturel*

L'excédent des naissances sur les décès, ordinairement appelé accroissement naturel, est un facteur primordial de croissance démographique. Bien que la statistique canadienne sur la natalité et la mortalité ne remonte qu'à 1921, on pourra se faire une idée du taux

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 263-264.