

Causes de décès d'enfants.—En 1962, plus des deux tiers des décès d'enfants ont résulté de la débilité, des malformations congénitales, de la pneumonie, de l'asphyxie et de l'atélectasie postnatales et de lésions obstétricales. La débilité fut la cause fondamentale de 2,304 décès et la cause secondaire de 3,170 autres. Les malformations congénitales ont provoqué 2,230 décès d'enfants; la pneumonie, 1,640; l'asphyxie postnatale, 1,475 et les lésions obstétricales, 1,338. Les taux de malformations congénitales et lésions obstétricales ont augmenté depuis trois ou quatre ans.

21.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1960-1962

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1960	1961	1962	1960	1961	1962
001-019	Tuberculose.....	7	8	6	1	2	1
020-029	Syphilis.....	—	1	3	—	—	1
045-048	Dysenterie.....	23	14	7	5	3	1
050	Scarlatine.....	1	1	1	—	—	—
052	Erysipèle.....	—	1	—	—	—	—
055	Diphthérie.....	—	—	—	—	—	—
056	Coqueluche.....	63	24	19	13	5	4
057	Infections à méningocoques.....	35	8	19	7	2	4
085	Rougeole.....	27	30	34	6	6	7
140-239	Tumeurs.....	44	42	37	9	9	8
273	Maladies du thymus.....	23	13	19	5	3	4
325	Déficiência mentale.....	52	75	65	11	16	14
340	Méningite (non méningococcique).....	89	109	94	19	23	20
391,392	Otite moyenne.....	86	59	66	18	12	14
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	57	81	45	12	17	10
480-483	Grippe.....	119	108	97	25	23	21
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,415	1,273	1,232	296	268	262
500-502	Bronchite.....	105	74	84	22	16	18
543	Gastrite et duodénite.....	5	4	2	1	1	—
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	97	107	97	20	22	21
571	Gastro-entérite et colite.....	483	400	373	101	84	79
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	5	2	4	1	—	1
750-759	Malformations congénitales.....	2,076	2,192	2,230	434	461	475
760,761	Lésions obstétricales.....	1,265	1,264	1,338	264	266	285
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,522	1,502	1,475	318	316	314
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	454	410	408	95	86	87
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	80	86	73	17	18	16
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	48	43	45	10	9	10
769	Toxémie prénatale.....	91	120	107	19	25	23
770	Érythroblastose.....	343	325	336	72	68	72
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	93	97	84	19	20	18
772	Déséquilibre alimentaire.....	48	53	48	10	11	10
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	875	972	1,095	183	204	233
774-776	Débilité.....	2,261	2,284	2,304	472	480	491
795	Causes mal définies ou inconnues.....	96	80	46	20	17	10
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	14	24	17	3	5	4
E900-E904	Chutes accidentelles.....	17	14	16	4	3	3
E916	Accidents causés par le feu.....	24	23	31	5	5	7
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	306	317	313	64	67	67
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	145	178	147	30	37	31
	Autres morts accidentelles et violentes.....	51	64	51	11	13	11
	Autres causes déterminées.....	532	458	473	111	96	101
	Total, toutes causes.....	13,077	12,940	12,941	2,733	2,720	2,755

Âge au décès.—Des 12,941 nouveau-nés décédés au cours de leur première année de vie, 8,783 ou près de 68 p. 100 n'avaient pas un mois; 4,998 sont décédés le jour de leur naissance, 2,718 entre le second et le septième jour, et 1,067 au cours des trois semaines qui ont suivi la naissance.