

## 24.—Mortalité puerpérale et taux pour 100.000 naissances vivantes, par cause, 1960-1962

| No de la<br>Liste inter-<br>nationale | Cause de décès  | Nombre de décès |            |            | Taux pour 100.000<br>naissances vivantes |           |           |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------|------------|--|-----------|-----------|
|                                       |   | 1960            | 1961       | 1962       | 1960                                     | 1961      | 1962      |
|                                       | <b>Complications de la grossesse</b> .....  | <b>69</b>       | <b>53</b>  | <b>52</b>  | <b>14</b>                                | <b>11</b> | <b>11</b> |
| 640, 641                              | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours<br>de la gestation.....                     | 1               | 1          | 3          | --                                       | --        | 1         |
| 642                                   | Toxémies gravidiques.....   | 36              | 29         | 23         | 8  | 6         | 5         |
| 643                                   | Placenta prævia remarqué avant l'accouche-<br>ment.....                                       | 3               | —          | —          | 1  | —         | —         |
| 644                                   | Autres hémorragies gravidiques.....   | 3               | 3          | —          | 1  | 1         | —         |
| 645                                   | Grossesse ectopique.....  | 7               | 5          | 6          | 1  | 1         | 1         |
| 646-649                               | Autres états pathologiques résultant de la gros-<br>sesse.....                                | 19              | 15         | 20         | 4  | 3         | 4         |
|                                       | <b>Avortement</b> .....   | <b>24</b>       | <b>26</b>  | <b>24</b>  | <b>5</b>                                 | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
| 650, 652                              | Avortement sans mention d'infection.....  | 6               | 10         | 9          | 1  | 2         | 2         |
| 651                                   | Avortement avec infection.....  | 18              | 16         | 15         | 4  | 3         | 3         |
|                                       | <b>Complications de l'accouchement</b> .....  | <b>83</b>       | <b>96</b>  | <b>78</b>  | <b>17</b>                                | <b>20</b> | <b>17</b> |
| 660                                   | Accouchement sans complication.....   | 1               | —          | —          | --                                       | —         | —         |
| 670                                   | Accouchement, compliqué de placenta prævia<br>ou d'hémorragie ante-partum.....                | 14              | 18         | 21         | 3  | 4         | 4         |
| 671                                   | Accouchement compliqué de rétention placen-<br>taire.....                                     | 4               | 3          | 3          | 1  | 1         | 1         |
| 672                                   | Accouchement compliqué d'autres hémorragies<br>post-partum.....                               | 20              | 20         | 21         | 4  | 4         | 4         |
| 673, 674                              | Accouchement dystocique par anomalie du bas-<br>sin osseux ou position anormale du fœtus..... | 5               | 8          | 6          | 1  | 2         | 1         |
| 675                                   | Accouchement dystocique par prolongation du<br>travail d'autre origine.....                   | 6               | 3          | 5          | 1  | 1         | 1         |
| 676, 677                              | Accouchement avec déchirure ou d'autres trau-<br>matismes.....                                | 18              | 27         | 8          | 4  | 6         | 2         |
| 678                                   | Accouchement avec d'autres complications.....   | 15              | 17         | 14         | 3  | 4         | 3         |
|                                       | <b>Complications des suites des couches</b> .....   | <b>39</b>       | <b>44</b>  | <b>37</b>  | <b>8</b>                                 | <b>9</b>  | <b>8</b>  |
| 681                                   | Infection pendant l'accouchement ou les suites<br>de couches.....                             | 8               | 13         | 13         | 2  | 3         | 3         |
| 682-684                               | Phlébite et thrombo-phlébite post-partum,<br>pyrexie, embolie pulmonaire.....                 | 15              | 13         | 12         | 3  | 3         | 3         |
| 685, 686                              | Éclampsie et toxémie post-partum.....   | 5               | 3          | 1          | 1  | 1         | --        |
| 687-689                               | Complications des suites des couches, autres ou<br>sans précisions.....                       | 11              | 15         | 11         | 2  | 3         | 2         |
|                                       | <b>Total, toutes causes puerpérales</b> .....   | <b>215</b>      | <b>219</b> | <b>191</b> | <b>45</b>                                | <b>46</b> | <b>41</b> |

**Âge au décès.**—Le tableau 25 répartit la mortalité puerpérale par groupe d'âge et selon l'âge moyen des mères au décès, lequel dépasse d'un peu plus de quatre ans l'âge moyen de toutes les mères au moment de l'accouchement. Jusqu'à ces dernières années, le risque de mortalité en couches se rattachait directement à l'âge de la mère; en d'autres termes, pour toutes les mères de plus de 20 ans le taux augmentait avec l'âge. Bien que le taux des décès de l'ensemble des groupes d'âge diminue depuis quelque temps, il y a eu des changements assez marqués. La mortalité pour les mères de 30-34 ans était autrefois deux ou trois fois aussi élevée que celle du groupe de 20-24, mais depuis quelques années les taux des quatre groupes d'âge des mères de moins de 35 ans ne différaient que très peu, bien qu'il augmentât vivement au-delà de 35 ans.