

élevée chez les nouveau-nés et les jeunes enfants réduit l'âge moyen et médian, tandis que le contraire s'observe en Colombie-Britannique et dans plusieurs autres provinces où la population est, en général, plus âgée.

17.—Âges moyens et médians au décès, par sexe et province, 1963

Province ou territoire	Âge moyen au décès		Âge médian au décès ¹	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	ans	ans	ans	ans
Terre-Neuve.....	51.0	57.4	62.8	69.8
Île-du-Prince-Édouard.....	63.2	70.8	71.6	78.3
Nouvelle-Écosse.....	61.6	66.7	69.4	74.9
Nouveau-Brunswick.....	59.9	63.9	69.1	73.7
Québec.....	56.6	60.1	64.3	69.4
Ontario.....	61.8	66.5	68.3	73.9
Manitoba.....	63.8	65.4	71.6	73.7
Saskatchewan.....	63.4	64.4	72.3	74.1
Alberta.....	60.0	61.7	69.2	72.0
Colombie-Britannique.....	64.7	67.3	72.2	75.3
Yukon.....	47.6	36.2
Territoires du Nord-Ouest.....	20.2	25.1
Canada.....	60.5	64.1	68.2	72.9

¹ L'âge au-dessus et au-dessous duquel la moitié des décès surviennent.

Décès dans les agglomérations urbaines.—Le tableau 2, pp. 262-264, donne le nombre de décès en 1963 dans les agglomérations urbaines de 20,000 habitants ou plus et la moyenne des décès de 1956 à 1960; la mortalité dans les agglomérations urbaines ne peut être calculée pour ces années, car le chiffre de leur population des périodes intercensales n'est pas connu.

Causes de décès.—Le tableau 18 récapitule la statistique la plus récente des décès et taux de décès au Canada, groupés selon la Liste abrégée internationale de 50 causes. Plus de 80 p. 100 des décès résultent de maladies cardio-vasculaires, du cancer, d'accidents, de maladies de la première enfance, de maladies de l'appareil respiratoire et de néphrites. En raison de l'avance de l'âge moyen au décès depuis une trentaine d'années, la proportion des décès attribuables à des causes intéressant les personnes âgées s'est accrue. Le cancer et les maladies cardio-vasculaires-rénales figurent pour une proportion plus considérable de tous les décès. Partant, les décès dus à des maladies qui frappent surtout les enfants et les jeunes adultes ont diminué.

18.—Décès et mortalité pour 100,000 habitants, selon la Liste abrégée internationale de 50 causes, 1962 et 1963

N° de la Liste internationale		Cause de décès	Décès		Taux pour 100,000 habitants	
Liste abrégée	Liste détaillée		1962	1963	1962	1963
B 1	001-008		Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	692	674	3.7
B 2	010-019	Autres formes de tuberculose.....	93	82	0.5	0.4
B 3	020-029	Syphilis et séquelles.....	129	117	0.7	0.6
B 4	040	Fièvre typhoïde.....	2	1	--	--
B 5	043	Choléra.....	--	--	--	--
B 6	045-048	Dysenteries de toutes formes.....	17	5	0.1	--
B 7	050, 051	Scarlatine et angine à streptocoques.....	8	5	--	--
B 8	055	Diphthérie.....	9	7	--	--
B 9	056	Coqueluche.....	24	28	0.1	0.1
B10	057	Infections à méningocoques.....	40	37	0.2	0.2
B11	058	Peste.....	--	--	--	--
B12	080	Poliomyélite aiguë.....	7	16	--	0.1
B13	084	Variole.....	--	--	--	--