

Causes de décès d'enfants.—En 1963, près de 70 p. 100 des décès d'enfants ont résulté de la débilité, des malformations congénitales, de la pneumonie, de l'asphyxie et de l'atélectasie postnatales et de lésions obstétricales. La débilité fut la cause fondamentale de 2,348 décès et la cause secondaire de 2,972 autres. Les malformations congénitales ont provoqué 2,068 décès d'enfants; la pneumonie, 1,506; l'asphyxie postnatale, 1,368 et les lésions obstétricales, 1,232. Les taux de malformations congénitales et lésions obstétricales ont diminué en 1963.

21.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1961-1963

No de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1961	1962	1963	1961	1962	1963
001-019	Tuberculose	8	6	5	2	1	1
020-029	Syphilis	1	3	3	--	1	1
045-048	Dysenterie	14	7	1	3	1	--
050	Scarlatine	1	1	--	--	--	--
052	Erysipèle	1	--	--	--	--	--
055	Diphthérie	--	--	--	--	--	--
056	Coqueluche	24	19	24	5	4	5
057	Infections à méningocoques	8	19	16	2	4	3
085	Rougeole	30	34	24	6	7	5
140-239	Tumeurs	42	37	48	9	8	10
	Maladies du thymus	13	19	5	3	4	1
325	Déficience mentale	75	65	67	16	14	14
340	Méningite (non méningococcique)	109	94	77	23	20	17
391,392	Otite moyenne	59	66	49	12	14	11
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires	81	45	46	17	10	10
480-483	Grippe	108	97	100	23	21	21
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)	1,273	1,232	1,146	268	262	246
500-502	Bronchite	74	84	45	16	18	10
543	Gastrite et duodénite	4	2	3	1	--	1
560-570	Hernie et occlusion intestinale	107	97	108	22	21	23
571	Gastro-entérite et colite	400	373	372	84	79	80
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse	2	4	2	--	1	--
750-759	Malformations congénitales	2,192	2,230	2,068	461	475	444
760,761	Lésions obstétricales	1,264	1,338	1,232	266	285	265
762	Asphyxie et atélectasie postnatales	1,502	1,475	1,368	316	314	294
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	410	408	360	86	87	77
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	86	73	67	18	16	14
765-768	Autres infections du nouveau-né	43	45	50	9	10	11
769	Toxémie prénatale	120	107	87	25	23	19
770	Erythroblastose	325	336	289	68	72	62
771	Maladie hémorragique du nouveau-né	97	84	83	20	18	18
772	Déséquilibre alimentaire	53	48	35	11	10	8
773	Maladies mal définies particulières à la naissance	972	1,095	1,118	204	233	240
774-776	Débilité	2,284	2,304	2,348	480	491	504
795	Causes mal définies ou inconnues	80	46	51	17	10	11
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles	24	17	19	5	4	4
E900-E904	Chutes accidentelles	14	16	13	3	3	3
E916	Accidents causés par le feu	23	31	22	5	7	5
E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires	317	313	290	67	67	62
E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle	178	147	162	37	31	35
	Autres morts accidentelles et violentes	64	51	50	13	11	11
	Autres causes déterminées	458	473	417	96	101	90
	Total, toutes causes	12,940	12,941	12,270	2,720	2,755	2,634

Age au décès.—Des 12,270 nouveau-nés décédés au cours de leur première année de vie, 8,411 ou plus de 68 p. 100 n'avaient pas un mois; 4,904 sont décédés le jour de leur naissance, 2,569 entre le second et le septième jour, et 938 au cours des trois semaines qui ont suivi la naissance.