

Mortalité infantile dans les agglomérations urbaines.—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes cités et villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 250-252), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

Causes de décès d'enfants.—En 1964, près de 70 p. 100 des décès d'enfants ont résulté de la débilité, des malformations congénitales, de la pneumonie, de l'asphyxie et de l'atélectasie postnatales et de lésions obstétricales. La débilité fut la cause fondamentale de 2,159 décès et la cause secondaire de 2,828 autres. Les malformations congénitales ont provoqué 1,969 décès d'enfants; la pneumonie, 1,255; l'asphyxie postnatale, 1,256 et les lésions obstétricales, 1,170. Les taux de toutes ces causes ont diminué en 1964.

21.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1962-1964

No de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1962	1963	1964	1962	1963	1964
001-019	Tuberculose.....	6	5	3	1	1	1
020-029	Syphilis.....	3	3	—	1	1	—
045-048	Dysenterie.....	7	1	1	1	—	—
050	Scarlatine.....	1	—	—	—	—	—
056	Coqueluche.....	19	24	15	4	5	3
057	Infections à méningocoques.....	19	16	18	4	3	4
085	Rougeole.....	34	24	23	7	5	5
140-239	Tumeurs.....	37	48	45	8	10	10
273	Maladies du thymus.....	19	5	12	4	1	3
325	Déficience mentale.....	85	97	58	14	14	13
340	Méningite (non méningococcique).....	94	77	86	20	17	19
391, 392	Otite moyenne.....	66	49	63	14	11	14
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	45	46	30	10	10	7
480-483	Grippe.....	97	100	37	21	21	8
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,232	1,146	948	262	246	209
500-502	Bronchite.....	84	45	72	18	10	16
543	Gastrite et duodénite.....	2	3	2	—	1	—
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	97	108	96	21	23	21
571	Gastro-entérite et colite.....	373	372	208	79	80	46
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	4	2	3	1	—	1
750-759	Malformations congénitales.....	2,230	2,068	1,969	475	444	435
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,338	1,232	1,170	285	265	258
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,475	1,358	1,256	314	294	277
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	408	360	307	87	77	68
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	73	67	57	16	14	13
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	45	50	41	10	11	9
769	Toxémie prénatale.....	107	37	91	23	19	20
770	Érythroblastose.....	336	289	251	72	62	55
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	84	83	93	18	18	21
772	Déséquilibre alimentaire.....	48	35	36	10	8	8
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	1,095	1,118	1,077	233	240	238
774-776	Débilité.....	2,304	2,348	2,159	491	504	477
795	Causes mal définies ou inconnues.....	46	51	27	10	11	6
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	17	19	32	4	4	7
E900-E904	Chutes accidentelles.....	16	13	9	3	3	2
E916	Accidents causés par le feu.....	31	22	18	7	5	4
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	313	290	276	67	62	61
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	147	162	158	31	35	35
	Autres morts accidentelles et violentes.....	51	50	43	11	11	9
	Autres causes déterminées.....	473	417	379	101	90	84
	Total, toutes causes.....	12,341	12,270	11,169	2,755	2,634	2,466

Âge au décès.—Des 11,169 nouveau-nés décédés au cours de leur première année de vie, 7,831 ou plus de 70 p. 100 n'avaient pas un mois; 4,724 sont décédés le jour de leur naissance, 2,295 entre le second et le septième jour, et 812 au cours des trois semaines qui ont suivi la naissance.