

Mortalité périnatale.—La mortalité «périnatale»,—le total des mort-nés et des décès de nouveau-nés vivants survenus «vers» la période natale,—est un concept de l'état civil relativement nouveau. Comme ces décès résultent souvent des mêmes causes latentes, associées à la grossesse ou à l'accouchement, peu importe qu'ils se produisent avant ou après l'accouchement, les décès périnatals sont généralement considérés comme comprenant le total des mort-nés qui ont cessé de vivre après au moins 28 semaines de gestation et les décès de nouveau-nés qui ne survivent pas à leur première semaine d'existence.

En 1964, il y a eu 12,539 décès périnatals, dont 5,520 mort-nés et 7,019 nouveau-nés qui n'ont pas survécu une semaine, et le taux national de ces décès s'est établi à 27.4 pour 1,000 accouchements. Le taux des décès périnatals a diminué lentement mais régulièrement de 65.2 en 1921 à 27.4 en 1964.

Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes enceintes ou en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 248-249, ayant atteint le chiffre le plus bas, soit 137, en 1964. Depuis 1951, la mortalité puerpérale pour 10,000 naissances, est inférieure à 10 et, depuis 1959, à cinq. Malgré cette amélioration, la mortalité puerpérale au Canada (3 en 1964) dépasse le taux de plusieurs autres pays (voir page 288). La mortalité chez les mères non mariées est plus élevée que chez les mariées.

Causes de la mortalité puerpérale.—Le tableau 24 donne les principales causes de mortalité puerpérale en 1962-1964.

24.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1962-1964

No de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1962	1963	1964	1962	1963	1964
	Complications de la grossesse.	52	43	35	11	9	8
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.	3	6	3	1	1	1
642	Toxémies gravidiques.	23	21	17	5	5	4
645	Grossesse ectopique.	6	8	6	1	2	1
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.	20	8	9	4	2	2
	Avortement.	24	27	22	5	6	5
650, 652	Avortement sans mention d'infection.	9	6	10	2	1	2
651	Avortement avec infection.	15	21	12	3	5	3
	Complications de l'accouchement.	78	67	48	17	14	11
670	Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.	21	20	6	4	4	1
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire.	3	5	4	1	1	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.	21	6	15	4	1	3
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus.	6	8	5	1	2	1
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.	5	4	1	1	1	--
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.	8	10	11	2	2	2
678	Accouchement avec d'autres complications.	14	14	6	3	3	1
	Complications des suites des couches.	37	28	32	8	6	7
680	Infection urinaire post-partum, sans autre infection.	--	--	1	--	--	--
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.	13	4	5	3	1	1
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire.	12	9	13	3	2	3
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum.	1	5	1	--	1	--
687-689	Complications des suites des couches, autres ou sans précisions.	11	10	12	2	2	3
	Total, toutes causes puerpérales.	191	165	137	41	35	30